

الانتقاء المناسب لتوزيع غرف العيادة

الشروط المناسبة للانتقاء:

- 1- مراعاة راحة المريض خلال وجودهم في العيادة سواء كانوا في حالة انتظار أو في غرفة المعالجة.
- 2- توفير الأمان في التوزيع بحيث لا يتعدى ولا يتجاوز كليا عن التقييم.
- 3- الانتباه إلى عدم التداخل بين الغرف تأكد من أن تكون غرفة الانتظار بعيدة عن مكان مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الموجودة فيها العيادة، فغرفة المناظرة شعبة تتركب من الأقسام الفحائية فمنها أنه تكون الأقسام عالية التجهيز فغرفة المناظرة المتطورة والغنية تضاف من لغز من سبيل التجهيز ويكون بجوار غرفة سترك للمعالجة لا اعتقاده بأنه متواءم أعلى من ذلك.
- 4- يجب الانتباه لمتطلبات الماء والكهرباء بحيث تكون أقصر ما يمكن لضمان توفيرها.
- 5- يجب أن تكون نسبة المساحة لكل غرفة في العيادة فالغرفة المتوسطة أو الضخمة يفضل أن يكون بجانب غرفة المعالجة لتسهيل الحركة.
- 6- يفضل استخدام الأبواب الجذابة لا اختصارها إلى حد.
- 7- علينا أن لا ننسى أن ندخل مجال الطبيعة باستخدام النباتات من الزهور.

التقييم في عيادة طب الأسنان

إذا كانت العيادة لا تتخلل بالنظافة أو أنه الروائح تنبعث منك فإنه أصبح الأثر في توجه مباشرة إلى الساحة السنية.

لا يوجد بديل للتكديف في عيادات العيادات السنية للمريض في العيادة السنية وذلك بالطهارة والتقييم، ومن الحكمة بمكانه أنه يقوم الطبيب أو مساعده بعرضه لإجراءات التقييم أمام المريض ومعرفة أنه معظم الجراحين الموصوفة بشكل طبيعي في الغم هي غير متارة لكنك من طمأنينة أنه أصبح مؤثرا إذا نقلت من قسم صرير إلى قسم صرير آخر وهذا يحدث عند ما تخرج منه الشج بوساطة الكلابات الحادة أو بالمسطر أو بآلة الحفنة.

فإن الأودرة الصغيرة يجب أن تشرف إلى إعادة بنفسك على غسلك جيداً بالماء والصابون بعد استخدامك ومن ثم تنشيفك ثم تقفك وللتعقيم طرائق عديدة أشهرها: أولاً كلفة غلي بالماء ولا يفضل درجة حرارة للتعقيم التامة إلا بالفلي لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة - التعقيم بالحرارة :

هناك طريقتان للتعقيم بالهواء، الأولى بالدفئة الكهربائية وتعاير درجة الحرارة ١٠٠°م والزمن اللازم لجلاء الحرارة فيه على هذه الدرجة ٥. دقيقة ويتوقف الحجز عن العمل تلقائياً بعد وصوله إلى الحرارة (١٠٠°) وهما يستطيع استعماله بحجبه تبريداً بالأكحول الطبي أو أنه يضع الأودرة للتعقيم في زجاجة زجاجية وعند العودة في اليوم التالي تكون الأودرة مفعلة جاهزة للاستعمال وبأدوية وهناك الكثير من الأودرة لا يمكن تعقيمها بهذه الطريقة لأن في تلك (القطعة من الشاش) أودرة المالحبة اللينة حيث تعقم بمادة تسمى أكسي الميلىن الذي يطلق غازاً قاتلاً للجراثيم وأبواخذ في جو مغلق لمدة ٤ ساعات (عازز الفورمول)

- التعقيم الكيميائي :

تأليود والأكحول والأكحول الطبي، همة تعقم أي أداة ملوثة يجب أن تنقع في الأكحول الطبي مدة (٤) ساعات ويجب على المساعدة أنه تقرأ المشرة المرافقة للمحلول المطهر بعناية فائقة وتنسب إلى تركيز المادة الدوائية والزمن اللازم همة تحدد تمام التعقيم أما بالنسبة للأجهزة الكبيرة فيجب على المساعدة أنه تقرأ وتنوعب التعليمات الواردة مع شركاء الرصنة عما هو مطلوب شخصياً وطرائق تطهيرها.

أما بالنسبة للقبضات: فهي تحتاج إلى تنظيف سبيلك مستر وبعد كل استعمال وتخلصه مع بقايا الألعاب أو لرم بوساطة من شاة بالماء الدافئ والصابون ثم تجفيف جيداً. وهناك زجاجة معدني خاصه تزجج به القبضة بعد زجاجة واما كل يوم ويظل الزيت به اخلك لليوم التالي همة تغسل القبضة للحفظ داخل المصهنة المجاورة للحجز همة ليغري الزيت منك ثم تغسل بالماء الدافئ والصابون وتجفف لتصبح جاهزة للعمل.

- التطهير :

وهو إضعاف معظم الإحياء المجهرية باستثناء البوائق وهي أقل فعالية
في عملية التعقيم وتطبق في حال تعذر إهدك طرائق التعقيم.

للتطهير نوعان :

١- التطهير بالغلي : التطهير بالمواد الكيميائية.

٢- المعنولات القوسية :

لمنع انتقال العدوى إلى الطبيب والمساعدة بحجب انتقال العدوى من المريض
المطهرة منه قبل المريض قبل زيارته للمعاينة ويجب أنه يتوافر في المضاد
المطهرة الشروط التالية وهي :

١- طيف واسع من مضاد الجراثيم بمكانه التطبيق (موضعي).

٢- أنه يكون تأثيرها سريعاً على الميكروبات.

٣- تقلل الجراثيم مما سترد يكون تأثيرها قاتلاً للجراثيم لا موقفاً لها أو مبطناً لها.

٤- أنه يكون تركيبه ثابتاً لا يتغير تأثيره عند استعماله في العلم.

٥- أنه تستثنى بعض الجراثيم الضرورية وغير الضارة بالعلم.

٦- أنه لا تشكل وتسميم (اعتقاد) معادلة جراثيمية.

٧- أنه لا يكون محسنة للأمن عند استخدامه المتكرر.

٨- أنه يترك تأثيراً باقياً بعد كل استخدام.

٩- أنه يكون منخفضة التوتر السطحي لتسهيل النفوذ.

١٠- ألا تكون باهظة الثمن للاستخدام الدوري.

وقائية طبيب الأسنان والمساعدة :

من الضروري أخذ العديد من اللقاحات لأطباء الأسنان وللمساعدة في ذلك

هذه اللقاحات هي التالية :

١- التريباكسيد البائي عن طريق الدم وهو مهم.

٢- الخزاز.

٣- الحصبة.

٤- سلة الأبقار.

٥- الكوليرا.

٦- السل.

٧- الإيدز.

- ١- الأبروات الوقائية خلال ممارسة العمل ليومي في الحياة :
- ٢- ارتداء الملابس الطبية المناسبة : (الرواد الأبيضين ، نظائ الرأس لتأدية أفضل حماية للجسم والجلد وتبديلها يوميا ويفضل غسلها بماء ودرجة حرارة ١٠٠م مع مادة مطهرة ملائمة .
- ٣- القناع الطبي : ويفضل أنه يشمل الذقن بالإضافة للأنف ، لمنع لتأثير أفضل حماية ممكنة للأغشية الفم والأنف من رذاذ ألعاب المرحضة .
- ٤- النظارات الطبية الواقية للعينين : وهما لا بد استعمال القناع ، الشفاف لكامل الوجه والذي يمكنه أن يقوم بدور القناع في الوقت نفسه .
- ٥- استخدام القفازات ذات الاستعمال الواحد بشكل صحيح وتبديلها بعد معالجة كل مريض .
- ٦- إبروات الحبر مع الكورت :
- ٧- استعمال كؤوس معادى ومعدات ألعاب ذات استعمال واحد .
- ٨- استعمال الساعات الجراحية .
- ٩- الوضع الملائم للمريض .
- ١٠- نظائ الكاحل المطاير .
- ١١- تطهير التعويضات السنية ، المصنوعة في المختبر قبل وضعها في فم المريض .
- ١٢- تجنب لمس الأشياء والأشياء الأخرى خلال المعالجة (الأوت - أدوات لتبكية)
- ١٣- نظائ إبروات خاصة لغزل وتعقيم وتطهير الأدوات المستعملة لمعالجة المريض الرضائي بالتدريج الأكبر البائي أو البيرز ... أو التخلع من الأذنه .
- ١٤- حماية الأيدي بشكل جيد مع الأدوات الواقية أو القاطعة .
- ١٥- الحرص على استعمال المحاقنة ذات الرؤوس التي تستعمل لمرة واحدة .
- ١٦- وضع الأدوات المعدنية أو الزجاجية ذات الاستعمال الواحد في الماء - رؤوس البر - الحجابات) في أوعية كسنية فائقة غير نفوذة قبل التخلع مني .
- ١٧- تعقيم وتطهير الأدوات حسب الأصول والتأكد من الفاعلية وليس أدوات هكز التعقيم بسيم فترة دأخرى .
- ١٨- بالنسبة للأدوات غير القابلة للتعقيم بالحرارة العالية (أدوات بلاستيكية - أدوات لسو الأسنان - سنابل حفر الأسنان) يجب تعقيمها وتطهيرها بواسطة محال كيميائية مناسبة وذات مستوى عالية كافي .

اللقبضات ومخافته الماء والهواء والامراض الجراحية.

والأهم اجراء وقائي لمنع ظهور هذه المؤثرات سببها في تشخيص القبضات أو مخافته الماء والهواء بشكل تجريبي لأكثر من وقتيقتين.

- أدوات وأقلام الاستئصال:

يفضل استخدام عظام بلاستيكية واقية في استعمالها.

قبضات التقليل بالوجبات فوق الصوتية (كافيترون):

تطبق عليها الإجراءات الطبقة الخارجية.

تظهر الأثر والتجارب:

ويعد الماء والصابون أو هيبوكلوريت الصوديوم من المواد الفعالة والمكانة

التي تلعب دورها في الحياة:

يجب استخدام أكياس بلاستيكية كسيلة للتنفايات العادية أما النفايات

المعدنية والزجاجية والحادة والصلبة لا تترك في موضع لئلا تحدث أضراراً

فاحسب غير قابل للسكر أو الأثقال.

خزنها - لا تظار:

يجب تظهير سطح السطح الظاهرة للأرض والجراسي والأدوات الموجودة

في خزنة النظارات بشكل يومي بتركيب الكلورين أو الفينول أو الإيدوكلور

أو غيرها من المواد الظاهرة للسطح.

- إجراءات التحرك من الإشتغال في مختبر الطب اللاسلكي :

نظراً للعلاقة الوثيقة بين الحياة والمختبر وخاصة فيما يتعلق بالسلامة
انتقال الإشتغال بواسطة الأجهزة والمعدات وغيرها ... يجب تطبيق
الآليات والإجراءات التالية :

⑤ قيام العاملين في المختبر بتطبيق إجراءات الوقاية نفسها التي تطبق على
الطلاب وخاصة من تلك المتعلقة بالقاعات وكذلك استعمال الروايات الخاصة
ومنع الوجه والظلمات الواقية ولقنات زائفة والاستعمال الواسع
من الأجهزة والأشياء والمعدات وتلعب دور المريض تماماً في كونه
مصدراً للإشتغال وانتقال العدوى فهي تحمل آثاراً من ألعاب ودم المريض.

⑥ التطهير الفوري لجميع المعدات والأعضاء والمنازل المختلفة الواردة من
الحياة إلى المختبر ... وبالنسبة للأجهزة التي تضررت فواصفات تركب
معدلات بالماء والصابون ثم نضجها بالحبس وفوق ذلك بطلاء
الأشياء الحساسة ... نظراً لكونها أقل من الأجهزة تأثراً بالمواد والطلاء
الكيميائية ... حيث لم يثبت حتى الآن تضرر فواصفات الأشياء الحساسة بـ
تطهيرها بالمواد الكيميائية المظلمة ...

والجدير بالذكر أيضاً كيفية التطهير في المختبر
المعدات الثابتة (المعدنية والخزنية).

- الأجهزة الكاملة والخزنية (أثرلية - معدنية خزنية) : غمر في
اليودوفور أو مركبات الكلور.

- الأشياء الحساسة : غمر في الإيثانول أو اليودوفور.

- الأعضاء السنية وتجهيزات العلاقة الفموية : غمر في اليودوفور.