

المحاضرة السادسة


PATHOLOGY OF THE Kidneys and Urinary Tract

د. حبيب جربوع




كلية طبيعية لدى بالغ تبدي قشر خارجي فاتح ولب أعمق وحويضة في المركز

د. حبيب جربوع




كبة كلوية طبيعية. العرى الشعرية الكبية رقيقة ورفيعة. الخلايا البطانية والخلايا
الميزانشيمية طبيعية العدد. الأنابيب المحيطة بها طبيعية

د. حبيب جربوع



كبة كلوية طبيعية ملونة بتلوين باس لتظهر الغشاء القاعدي. العرى الشعرية الكبية واضحة

د. حبيب جربوع



مخطط لكبة طبيعية. لاحظ علاقة العرى الشعرية بالميزانشيم. حوالي ١٥% من الرشح الكبي يحدث عبر الميزانشيم. بشكل طبيعي الألبومين لا يمر عبر الإندوتليوم بسبب حاجز الشحنات الطبيعي. الميزانشيم الطبيعي يحوي من ٢-٤ خلايا ميزانشيمية وظيفتها تشبه البالعة

د. حبيب جربوع

١. الأمراض التطورية Developmental Disorders

يمكن أن تكون كبيرة وواضحة عند الولادة أو أثناء الطفولة، أو صغيرة ولا عرضية. بعض الأمراض {مثل المرض الكلوي عديد الكيسات الجسدي القاهر (ADPKD)} تؤدي لظهور أعراض متأخرة أثناء الحياة

A. عدم تصنع الكلية Renal agenesis:

١. عدم تصنع كلية واحدة يحدث بنسبة ١/٨٠٠ مولود وعادة لا عرضي
٢. عدم تصنع الكليتين (متلازمة بوتز) ويحدث بنسبة ١/٥٠٠٠ مولود وهو قاتل

B. كلية نعل الفرس Horseshoe kidney: والتي تحدث عندما تفشل الكليتان بالانفصال عند القطب السفلي خلال التطور، يمكن أن تسبب انضغاط الوريد الأجوف أو الشريان الأبهر

C. الكلية الهاجرة Ectopic kidney: هجرة غير طبيعية باتجاه الأعلى لكلى الجنين تؤدي إلى توضع شاذة. الكلى الهاجرة غالباً تتوضع في الحوض وتكون ميالة للأخماج أو الانسدادات

د. حبيب جربوع



كلية نعل الفرس. تشوه خلقي غالباً ما يحدث بالترافق مع تشوهات أخرى أو متلازمات مع عيوب جينية محددة مثل تثالث الصبغي ١٨. يمكن أن يحدث كتشوه معزول. المشكلة الممكن حدوثها هنا انسداد الحوالب بشكل جزئي بسبب مسارها غير الطبيعي وبالتالي حدوث استسقاء كلوي

د. حبيب جربوع

D. الداء الكيسي الكلوي Renal cystic disease: ينتج من التمايز غير الطبيعي للأرومة الكلوية

١. سوء التصنع الكلوي متعدد الكيسات **Multicystic renal dysplasia:** كيسات منغرسية في لحمية نسيج ضام متشكلة من نسيج هاجر (مثلاً غضروف). وعادة يظهر هذا المرض كتلة كلوية وحيدة الجانب

ملاحظة: كتلة بطنية مجسوسة لدى طفل عادة تكون واحدة من ثلاثة: سوء التصنع الكلوي متعدد الكيسات، ورم ويلمس، أو نوروبلاستوما على حساب الغدة الكظرية

٢. الداء الكلوي عديد الكيسات الجسدي القاهر **Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD):** وسببه شذوذات في المورثتين، ويحدث بنسبة ١/١٠٠٠ مولود. نموذجياً نشاهد تضخم ثنائي الجانب في الكليتين واللتان تحويان العديد من الأكياس المليئة بالسائل وتزن كل كلية أكثر من ١٠٠٠ غ ويحدث القصور الكلوي متأخراً أثناء البلوغ

٣. الداء الكلوي عديد الكيسات الجسدي الصاغر **Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD):** هو أقل شيوعاً من القاهر. تكون الكلى متضخمة قليلاً وتحوي أكياس صغيرة ويحدث القصور الكلوي أثناء الطفولة

د. حبيب جربوع




سوء التصنع الكلوي عديد الكيسات. هذه الحالة يجب تمييزها عن RPKD لأنها تحدث بشكل فرادي غير وراثي، وهي أكثر شيوعاً من RPKD. الأكياس أكبر ومختلفة الحجم. غالباً وحيدة الجانب. وحتى إذا كانت ثنائية الجانب فهي غالباً لا عرضية. إذا كانت ثنائية الجانب يمكن أن يحدث قلة السائل الأمنيوسي واختلاطاته

د. حبيب جربوع



سوء التصنع الكلوي عديد الكيسات يظهر تنوع حجم الكيسات التي تحتل البرانشيم
الكلوي

د. حبيب جربوع



سوء التصنع الكلوي عديد الكيسات يبدي أكياس كبيرة مبطنة بطبقة واحدة من
ظهارة مسطحة إلى مكعبة، يتخللها برانشيم متليف يحوي جزر من غضروف والقليل
من الكيب

د. حبيب جربوع



الكلى خلف البريتوان متضخمة في الجهتين لدى بالغ توفي من اختلاطات القصور الكلوي المزمن. هذا المريض لديه داء كلوي عديد الكيسات جسدي قاهر DPKD

د. حبيب جربوع




في الـ DPKD يستبدل البرانشيم الكلوي بكيسات كبيرة

د. حبيب جربوع



هذه الكلية في مريض DPKD تزن ٣ كغ. هذا المرض وراثي قاهر، لذلك فخطورة حدوثه لدى أفراد العائلة ٥٠%. الأكياس لا توجد عادة عند الولادة لكنها تتطور ببطء مع الزمن، لذلك فإن بداية حدوث القصور الكلوي تكون متأخرة لمرحلة البلوغ أو أكثر

د. حبيب جربوع




هذا الطفل توفي مباشرة بعد ولادة باكرة في الأسبوع ٢٣ من الحمل بسبب عدم تصنيع الرئتين كنتيجة لنقص السائل الأمنيوسي. هذا النقص يحدث كنتيجة لنقص الناتج البولي للجنين وذلك كاختلاط للداء الكيسي الكلوي. لاحظ هنا تضخم الكلى ثنائي الجانب. الطفل لديه RPKD

د. حبيب جربوع



RPKD لاحظ أن الأكياس صغيرة لكنها متوزعة بشكل متماثل عبر البرانشيم، لذلك هذا المرض عادة متناظر المظهر يبدي ضخامة في الكليتين. نسبة حدوثه في العائلة ٢٥% لأنه وراثي جسدي صاغر. عادة لا يعيش المرضى طويلاً

د. حبيب جربوع



RPKD. الأكياس تملأ معظم البرانشيم ومن الصعب أن نجد كيب. العديد من الأكياس متطاولة ومتوضعة بشكل متشعب من مركز الكلية

د. حبيب جربوع

II. التهابات الكبد والكلية Glomerulonephritis

في كل أشكال التهابات الكبد والكلية، توضع معقدات مناعية ضمن الكبد يؤدي إلى التهاب. الاستجابة الالتهابية يمكن أن تسبب تكاثر الخلايا البطانية والميزانشيمية والظهارية وفي الحالات الشديدة تسبب نخر الكبة الكلوية. سريراً يسبب التهاب المتلازمة النفريتية nephritic syndrome، والتي تتألف من وذمة وبيلة بروتينية ونقص ألبومين الدم وبيلة دموية وفرط ضغط الدم

A. التهابات الكبد والكلية التكاثرية :

١. التهاب الكبد والكلية الحاد التالي للعقديات

٢. اعتلال الكبد بال-IgA

٣. التهاب الكلية الذئبي

B. التهابات الكبد والكلية ذات الأهلة:

١. متلازمة غود باستور

٢. حبيوم واغئر

د. حبيب جربوع

A. التهابات الكبد والكلية التكاثرية Proliferative glomerulonephritis:


١. التهاب الكبد والكلية الحاد التالي للعقديات Acute poststreptococcal

glomerulonephritis: يكون عادة تالي لالتهاب الحلق بالعقديات ويتطور بعد ٢-٤ أسابيع من الخمج البدئي. معظم المرضى أطفال ويشفون تلقائياً. فقط ١-٢% من المرضى يتطور لديهم التهاب كبد وكلية مزمن

a. الموجودات الباثولوجية: وتتضمن فرط خلوية الكبة والتي تحوي خلايا التهابية (مثلاً عدلات وبالعات) وزيادة عدد الخلايا الظهارية والميزاناشيمية. تشاهد بالمجهر الإلكتروني معقدات مناعية تحت ظهارية (Subepithelial humps)


b. الموجودات السريرية: سريراً يتظاهر التهاب الكبد والكلية الحاد التالي للعقديات بفترة قصيرة من المتلازمة النفريتيّة، وتتصف بوذمة وبيلة بروتينية وتعدد بيلات وبول بني (بول مدمى) وفرط ضغط الدم

د. حبيب جربوع




التهاب كيب وكلية تكاثري (التهاب كيب وكلية تالي للعقديات). الكبة الكلوية مفرطة
الخلوية والعري الشعيرية غير واضحة الحدود

د. حبيب جربوع




إن فرط الخلوية في التهاب الكبد والكلية التالي للعقديات سببه زيادة عدد الخلايا الظهارية والبطانية والميزانشيمية بالإضافة للعدلات ضمن العرى الشعرية وحولها. هذا المرض يمكن أن يحدث بعد عدة أسابيع من الخمج بالمجموعة A من العقديات الحالة للدم. يبدي المريض عادة ارتفاع مستويات ASO في المصل

د. حبيب جربوع



التهاب كبد و كلية تالي للعقديات (بالتألق المناعي) يبدي توضع معقدات مناعية
تحت ظهارية بشكل حبيبي (humps)

د. حبيب جربوع



بالمجهر الإلكتروني، توضع المعقدات المناعية في التهاب الكبد والكلية التالي للعقديات يكون تحت ظهاري بشكل humps إلى اليمين من الغشاء القاعدي. العرى الشعرية مليئة بالعدلات


د. حبيب جربوع

٢. اعتلال الكبد بالـ IgA (Berger disease) IgA nephropathy: وهو أشيع أشكال التهابات الكبد والكلى. يمكن أن يحدث بعد الأخماج ولكن إمرضيته غير معروفة

a. الموجودات الباثولوجية: وتتضمن تكاثر خلايا ميزانشيمية بؤري وتوضع ميزانشيمي للـ IgA (يشاهد بالمجهر الإلكتروني أو بالتألق المناعي)


b. الموجودات السريرية: تتنوع من بيلة دموية خفيفة مع بيلة بروتينية إلى تطور بطيء باتجاه القصور الكلوي. لا يستجيب المرضى للعلاج بالأدوية المثبطة للمناعة أو الستيرويدات

د. حبيب جربوع



داء برجر أو اعتلال الكلية بال-IgA. يتوضع ال-IgA بشكل أساسي في الميزانشيم
ومن ثم تزيد خلوية الميزانشيم. يأتي المريض عادة بقصة بول مدمى

د. حبيب جربوع



اعتلال كلية بال-IgA (بالتألق المناعي) يبدي إيجابية أضداد ال-IgA ذات التوضع
الميزانشيمي


د. حبيب جربوع

٣. التهاب الكلية الذئبي **Lupus nephritis**: يوجد في ٧٥% من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية (SLE). عادة يمكن أن يعالج الالتهاب بالكورتيكوستيرويدات والسيكلوفوسفاميد. على كل حال تقريباً ٢٠% من المرضى يأتون باعتلال كلية غشائي والذي هو معد للعلاج

a. الموجودات الباثولوجية: تتضمن كيب مفرطة الخلوية مع تثخن الأغشية القاعدية بشكل wire loop. تتوضع معقدات مناعية مختلفة الحجم ويمكن أن توجد في أي جزء من الكبة

b. الموجودات السريرية: تتنوع من بيلة دموية وبيلة بروتينية خفيفة إلى علامات سوء الوظيفة الكلوية الشديد. أضداد الـ ANA والتظاهرات السريرية الأخرى للـ SLE تكون واضحة

د. حبيب جربوع



التهاب الكلية الذئبي. لاحظ ثخانة جدر العرى الشعرية (wire loop) والسبب في هذه الحالة هو SLE


د. حبيب جربوع

B. التهابات الكبد والكلية ذات الأهلة Crescentic glomerulonephritis: ويحدث كنتيجة لالتهاب الكبد والكلية النخري البؤري. بعد تمزق عروة الأوعية الشعرية للكبة المتأذية تملأ النتحة الالتهابية الحاوية على البالعات المسافة البولية الكبية. النتحة الالتهابية مع تكاثر الخلايا الظهارية التي تبطن محفظة بومان تشكل الأهلة، مما يؤدي لتطور التهاب كبد وكلية سريع الترقى مؤدياً لقصور كلوي حاد

١. **متلازمة غود باستور:** سببها أضداد ضد الغشاء القاعدي للكبة الكلوية، والتي ترتكس ضد الغشاء القاعدي للأسناخ والكبد الكلوية مؤدية لنزف رئوي و التهاب كبد وكلية. ارتباط الأضداد المناعية الذاتية بشكل مباشر مع الغشاء القاعدي للكبة الكلوية يؤدي إلى نموذج خطي يشاهد بالتألق المناعي (بعكس النموذج الحبيبي للتوضع المشاهد في الأشكال الأخرى من التهابات الكبد والكلية)


٢. **حبيبوم واغنز:** يتصف بالتهاب أوعية حبيبومي واحتشاءات خثرية في السبيل التنفسي العلوي والرئتين. لا تبدي الكبد الكلوية توضع معقدات مناعية ولكن اختبار أضداد c-ANCA يكون إيجابي

د. حبيب جربوع




التهاب الكبد والكلية ذو الأهلة. كبة كلوية تبدي هلال من تكاثر خلايا ظهارية.
التهاب الكبد والكلية سريع الترقى يمكن أن يكون مجهول السبب أو تالياً للذئبة أو
بعد الأخماج (كما في بعض حالات التهاب الكبد والكلية التالي للعقديات)، أو بسبب
التهابات الأوعية المختلفة أو متلازمة غود باستور

د. حبيب جربوع




التهاب كيب وكلية ذو أهلة (بالتألق المناعي)

د. حبيب جربوع




التألق المناعي في متلازمة غود باستور يبدي إيجابية أضداد الـ IgG التي تتوضع
بشكل خطي على الغشاء القاعدي

د. حبيب جربوع



خزعة كلية عند مريض حبيبوم واغتر تبدي آفة بؤرية تتركز حول وعاء دموي
(التهاب وعائي). الكبة الكلوية تحته تبدو طبيعية. خزعة الكلية الكافية يجب أن
تحتوي على الأقل ٦ كيب كلوية

د. حبيب جربوع



حبيبوم واغتر. الالتهاب الوعائي يشمل فرع الشريان الكلوي وهو التهاب وعائي
نخري حبيبومي. أضداد الـ c-ANCA تكون إيجابية

د. حبيب جربوع

III. اعتلال الكلية Glomerulopathy

هو مصطلح يطبق على الأمراض التي تعطي علامات المرض الكبي لكن بدون التهاب، هذه الأمراض تسبب المتلازمة النفروزية nephrotic syndrome والتي تتألف من وذمة وبيلة بروتينية ونقص ألبومين الدم وفرط شحوم الدم والبول

A. اعتلال الكلية الغشائي

B. المرض قليل التبدلات

C. التصلب الكبي المقطعي البؤري

D. اعتلالات الكبد غير مناعية المنشأ


د. حبيب جربوع

A. اعتلال الكلية الغشائي Membranous nephropathy: أشيع سبب كلوي بدئي للمتلازمة النفروزية عند البالغين، يتصف بتوضع معقدات مناعية تحت ظهارية بشكل حبيبي (lumpy-bumpy). المرض لا يستجيب للعلاج ويتطور لقصور كلوي نهائي خلال فترة ١٢ - ١٥ سنة

١. اعتلال الكلية الغشائي البدئي: مجهول السبب


٢. اعتلال الكلية الغشائي الثانوي: يشاهد لدى بعض مرضى الـ SLE، السرطان، أو الأحماج (مثل التهابات الكبد الفيروسية). في هؤلاء المرضى، الاعتلال الكلوي يمكن أن يكون متعلقاً بمعقدات الضد-مستضد في الدوران (مثل تلك المتشكلة من المستضدات الورمية أو مستضدات التهابات الكبد الفيروسية B أو C)

د. حبيب جربوع




اعتلال الكلية الغشائي. تبدو العرى الشعرية متتخنة لكن لا تزيد الخلوية. هو أشيع أسباب المتلازمة النفروزية عند البالغين. بعض الحالات مرتبطة بالأمراض الخمجية المزمنة مثل التهاب الكبد B، أو السرطان، أو الـ SLE، وبعضها مجهول السبب

د. حبيب جربوع




اعتلال كلية غشائي ملون بالفضة التي توضح الغشاء القاعدي. نلاحظ عليه
اندفاعات بلون أسود حول العرى الشعرية

د. حبيب جربوع



اعتلال كلية غشائي بالتألق المناعي يبدي توزيع معقدات الـ IgG والمتممة بشكل
حبيبي على الغشاء القاعدي تحت الظهارة

د. حبيب جربوع




اعتلال كلية غشائي بالمجهر الإلكتروني يبدى توضع معقدات مناعية بشكل حبيبي
ضمن الغشاء القاعدي المتثخن

د. حبيب جربوع

B. المرض قليل التبدلات Minimal change disease (النفروز الليبيدي lipoid nephrosis): أشيع أسباب المتلازمة النفروزية عند الأطفال، وهو مرض مجهول الآلية يصيب غالباً الأطفال. بالمجهر الضوئي والتألق المناعي تبدو الكُـبـب طبيعية، لكنها تبدي بالمجهر الإلكتروني التحام الاستطالات القدمية. يستجيب المرضى جيداً للعلاج بالكورتيكوستيروئيدات


C. التصلب الكبي المقطعي البؤري Focal segmental glomerulosclerosis: هو مرض مجهول الآلية يشمل فقط بعض الكُـبـب (لذلك التسمية بؤري) ويتصف بتهلين (تصلب) جزء من هذه الكُـبـب (ولذلك التسمية مقطعي). المرض يمكن أن يكون مجهول السبب أو ثانوي لمرض جهازى (مثل الإيدز) وهو غير مستجيب للعلاج

د. حبيب جربوع




المرض قليل التبدلات (بالمجهر الإلكتروني) يتصف بانمحاء الاستطالات القدمية للخلايا الظهارية (تعطي مظهر التحام) وغياب حاجز الشحنات الطبيعي ولذلك يتسرب الألبومين خارجاً وتحدث بيلة بروتينية. الغشاء القاعدي والخلايا البطانية طبيعية. بالمجهر الضوئي تبدو الكُـبـب طبيعية

د. حبيب جربوع



التصلب الكبي البؤري المقطعي. نشاهد منطقة من التصلب الكولاجيني في منتصف الكبة. بعكس المرض قليل التبدلات، تحدث هنا بيلة بروتينية غير انتقائية وبيلة دموية ويتطور إلى القصور الكلوي المزمن ولا يستجيب جيداً للعلاج بالكورتيكوستيروئيدات

د. حبيب جربوع



تصلب كبي بؤري مقطعي يوضح الكولاجين بلون أزرق

د. حبيب جربوع

D. اعتلالات الكبد غير مناعية المنشأ Glomerulopathies of nonimmune

origin: تكون موجودة في مرضين جهازيين، الداء السكري والنشواني

١. **اعتلال الكبد السكري:** يحدث بشكلين، منتشر أو عقيدي (مرض كميل ستيل

ويلسون). إن اعتلال الكبد السكري هو أشيع أسباب المتلازمة النفروزية


٢. **النشواني:** يمكن أن يكون مظهراً للنقيوم المتعدد (النشواني البدئي) أو كاختلاط

لمرض قحي مزمن (النشواني الثانوي)

ملاحظة: اليوريميا (أي المرحلة النهائية للمرض الكلوي) يمكن أن تتطور مع الزمن


في أي مرض كبي

د. حبيب جربوع



مرض كميل ستيل ويلسون (تصلب كبي عقيدي) في الداء السكري. عقيدات من مواد هياينية زهرية اللون تتشكل في مناطق من العرى الشعرية الكبية ضمن الكبة وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المطرق الميزانشيمي (سببها الأذية نتيجة الانحلال السكري غير الأنزيمي للبروتينات)

د. حبيب جربوع




تلوين باس لمرض كميل ستيل ويلسون (تصلب كبي عقيدي) عند مريض يعاني من
الداء السكري منذ فترة طويلة. لاحظ أيضاً التسمك الملحوظ لجدار الشرين وهو
نموذجي للتصلب الشرياني الهyalيني المشاهد في الكلية السكرية أيضاً

د. حبيب جربوع




الداء النشواني. توضعات من المادة النشوانية بلون فاتح في القشر الكلوي

د. حبيب جربوع



الأميلويد يمكن أن يتوضع حول الشرايين وفي الخلال وفي الكبد، وهو يتوضع
بتلون أحمر الكونغو. هذا التوضع يزيد من حجم الكلية ولكنه ينقص وظيفتها

د. حبيب جربوع




توضع الأميلونيد في الكبد والشرابين. يمكن أن يكون من نمط AL (النقيوم المتعدد) حيث يترافق الأميلونيد مع زيادة إنتاج الغلوبولينات المناعية خفيفة السلسلة، أو من نمط AA حيث يكون السبب غالباً مرض التهابي مزمن

د. حبيب جربوع

IV. التهاب الكلية الخلالي الأنبوبي Tubulointerstitial nephritis

A. التهاب الكلية الخلالي الأنبوبي الحاد (الأليرجيائي): غالباً سببه فرط الحساسية من النمط الرابع (المعتمد على الخلايا) كارتكاس للعلاج الدوائي. باثولوجياً يتصف بأذية الأنابيب وارتشاح خلال الكلية بلمفاويات تائية وبالعات وحمضات. يأتي المريض بقصة قصور كلوي حاد

B. التهاب الكلية الخلالي الأنبوبي المزمن (المعتمد على المناعة): هو مظهر نموذجي للرفض المزمن للكلية المزروعة




الرفض المزمن للكلية المزروعة. لاحظ ثخانة وتليف بطانة الشريينات والالتهاب المزمن

د. حبيب جربوع

٧. التهابات السبيل البولي (Urinary tract infections (UTIs)

طريق الخمج يمكن أن يكون إما دموي (مثلاً في مرضى الأخماج أو الصمة الخمجية أو التهاب الشغاف) أو صاعد. العوامل التي تهيئ لالتهابات السبيل البولي الصاعدة هي: الحصيات البولية، الحالب العرطل الخلقي، التضيقات، الحمل، الأورام، عدم كفاءة المصرة المثانية الحالبية، التهاب المثانة المزمن (الحصيات، الأخماج المتكررة، المثانة العصبية، التداخل بالأدوات)، فرط التصنع البروستاتي السليم، الإحليل القصير (عند الإناث)

ملاحظة: التهابات السبيل البولي تشخص سريرياً ويثبت التشخيص بتحليل البول والذي يبدي مستعمرات جرثومية أكثر من ١٠٠٠٠٠ /مل وكريات بيض



أثناء مرور الحصة عبر السبيل البولي يمكن أن تسد أي منطقة

د. حبيب جربوع

A. التهاب الإحليل Urethritis: أشيع أسباب التهابات السبيل البولي. يمكن أن يكون السبب عوامل ممرضة منتقلة بالجنس (مثل *Neisseria gonorrhoeae* و *Chlamydia trachomatis*) أو عوامل ممرضة بولية سلبية الغرام (مثل *Escherichia coli* و *Pseudomonas aeruginosa*). يعاني المرضى من إحاح بولي وحرقة أثناء التبول ومفرزات إحليلية

B. التهاب المثانة Cystitis: هو عادة اختلاط لالتهاب الإحليل لكن يمكن أن يحدث كمرض بدئي تالياً للتداخل بالأدوات (مثل القثطرة أو تنظير المثانة)، أو الانسداد البولي (مثل فرط التصنع البروستاتي السليم)، أو تخريش المثانة (مثلاً كنتيجة للحصيات البولية). يأتي المرضى بقصة إحاح وعسر تبول وبيلة دموية، يمكن كشف الجراثيم والكريات البيض في البول

د. حبيب جربوع



مثانة مفتوحة تبدي مناطق من فرط تبغ المخاطية. التشخيص التهاب مثانة حاد

د. حبيب جربوع



بروستات متضخمة وخصوصاً الفص المتوسط أدى لانسداد الإحليل البروستاتي،
وكننتيجة لانسداد الطرق البولية المزمن تصبح المثانة مفرطة التصنع ومتضخمة
ذات مخاطية تريبقية نلاحظ وجود حصاة

د. حبيب جربوع

C. التهاب الحالب Ureteritis: يمكن أن يحدث كنتيجة للقلس المثاني الحالبى ويمكن أن يتطور إلى التهاب حويضة وكلية. العيب الخلقي المؤهب للقلس المثاني الحالبى يوجد في ٢ - ٣% من المرضى وهو سبب مهم لالتهاب السبيل البولي عند الفتيات الصغيرات والنساء

D. التهاب الحويضة والكلية Pyelonephritis: هو مصطلح يستخدم للالتهاب الجرثومي للكلية والكؤيسات والحويضة

ملاحظة: لتذكر العوامل الممرضة البولية سلبية الغرام المسؤولة غالباً عن التهاب الحويضة والكلية تذكر كلمة KEEPS: Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Proteus, Serratia

د. حبيب جربوع

١. **التهاب الحويضة والكلية الحاد:** هو التهاب قيحي يمكن أن يشمل كلية واحدة أو

الكليتان. يأتي المريض بقصة ألم خاصرة وحرارة وعسر تبول

٢. **التهاب الحويضة والكلية المزمن:** سببه الأخماج طويلة الأمد أو الناكسة.

باثولوجياً يتصف التهاب الحويضة والكلية المزمن بتندب غير منتظم للكلية وتشوه


الجهاز الجامع واستسقاء كلوي وفقدان البرانشيم الكلوي. الاختلاطات تتضمن:

a. القصور الكلوي النهائي، عند المرضى ذوي الإصابة ثنائية الجانب

b. النخر الأنبوبي والذي يمكن أن يسبب القولنج البولي وذلك بسبب انسداد الحوالب

بالحليمات المتسلخة

د. حبيب جربوع




استسقاء كلوي بؤري أي توسع الجهاز الجامع (في القسم السفلي للكلية) بسبب
حصاة سادة لكؤيسات القطب السفلي. الركودة الناجمة عن الانسداد والتوسع تؤدي
إلى الالتهاب (المناطق الصفراء حول الكؤيسات). القطب العلوي طبيعي

د. حبيب جربوع



كلية تبدي استسقاء كلوي أشد. نرى فقط بقايا رقيقة من القشر. مثل هذه الكلية غير وظيفية وهي مصدر للخمج. إذا كانت وحيدة الجانب يكون الانسداد في مستوى الحويضة (حصاة حويضة أو كؤيسات)، أما إذا كانت ثنائية الجانب يكون الانسداد في المثانة أو الاحليل (فرط تصنع البروستات أو ورم)

د. حبيب جربوع




استسقاء كلوي بسبب حصاة سادة عند الوصل الحويضي الحالبى مع غياب القشر
بشكل كامل

د. حبيب جربوع




استسقاء كلية واستسقاء حالب بسبب انسداد طويل الأمد

د. حبيب جربوع




التهاب جرثومي صاعد أدى إلى التهاب حويضة وكلية حاد. نشاهد العديد من
العدلات تملأ الأنابيب البولية

د. حبيب جربوع




التهاب حويضة وكلية حاد يبدى ارتشاح العدلات في الأنابيب والخلل

د. حبيب جربوع



تجمع خلايا التهابية مزمنة في مريض لديه قصة التهابات سبيل بولي متعددة ومتكررة. التشخيص التهاب حويضة وكلية مزمن

د. حبيب جربوع



التهاب حويضة وكلية مزمن يبدي لمفاويات وخلايا بلاسمية. الخلايا اللمفاوية يمكن أن توجد في أي مرض كلوي مزمن (التهاب الكبد والكلية، التصلب الكلوي، التهاب الحويضة والكلية)، لكن الخلايا البلاسمية مميزة لالتهاب الحويضة والكلية المزمن

د. حبيب جربوع

٧١. الاضطرابات الدورانية Circulatory disorders

A. النخر الأنبوبي الحاد (ATN) بنقص التروية: هو اختلاط شائع لنقص التروية الكلوية في مرضى صدمة نقص الحجم أو الصدمة اليفانية أو الوهط الوعائي بسبب قصور المضخة (مثل احتشاء العضلة القلبية). النخر الأنبوبي يؤدي إلى قلة التبول، وهو قابل للتراجع لأن الأنبيب تتجدد. المرضى الموضوعين على التحال الدموي ينجون ويدخلون في طور تعدد بيلات قبل الشفاء الكامل. يحوي البول اسطوانات حبيبية بنية غامقة

B. نخر القشر الكلوي ثنائي الجانب: هو اختلاط للارتجاج الحملي وانفصال المشيمة والنزف بعد الولادة أو الصدمة اليفانية

د. حبيب جربوع

C. نقص التروية الكلوية المزمن: ينتج من التصلب العصيدي ويتصف بتهلين الكبد وضمور وفقدان الأنابيب والتليف الخلالي. الكلى تكون صغيرة ومنكمشة ويمكن أن تكون لا وظيفية. نقص التروية الكلوية المزمن هو سبب مهم للقصور الكلوي النهائي عند الكهول

د. حبيب جربوع


VII. أذيات الكلية الاستقلابية أو السمية

A. النخر الأنبوبي الكلوي الحاد السمي **Nephrotoxic ATN**: ينتج من التسمم بالمعادن الثقيلة (مثل الزئبق)، مركبات الفوسفور العضوية، وبعض الأدوية العلاجية (مثل الجنتاميسين)

B. اعتلال الكلية السكري **Diabetic nephropathy**: الداء السكري يؤهب المريض لـ:

١. تصلب الكبي، والذي يؤدي إلى المتلازمة النفروزية
٢. تصلب الشرياني، والذي يؤدي لنقص التروية الكلوية وفرط ضغط الدم
٣. التهاب الحويضة والكلية (كنتيجة لفرط سكر الأنسجة الخلالية والذي يسهل الإصابة بالخمج الجرثومي)
٤. النخر الحليمي

د. حبيب جربوع



نلاحظ توسع وتحوصل خلايا الأنايب كنتيجة للتسمم. هذا يمثل نخر أنبوبي حاد وله عدة أسباب. يمكن أن ينتج من السموم ويكون بشكل منتشر، أو من نقص التروية (كما في هبوط الضغط الشديد في قصور القلب) فيكون بؤري

د. حبيب جربوع

- C. فرط حمض البول في الدم **Hyperuricemia**: يؤدي لتوضع حمض البول في البرانشيم والأنابيب الكلوية، ويشكل حصيات بولية
- D. **الحصيات البولية Urolithiasis**: هي مرض شائع، ٥-١٠% من السكان يصابون به خلال مسيرة حياتهم. الرجال يصابون أكثر من النساء


١. أنماط الحصيات البولية:

- a. **حصيات أوكزالات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم:** تشكل ٧٥% من الحصيات. إن فرط كلس البول وفرط حمض البول في البول تعتبر عوامل الخطورة الرئيسية لها
- b. **حصاة قرن الوعل Staghorn (struvite) calculi:** هي حصاة فوسفات المغنزيوم الأميني والتي تتشكل في البول القلوي، مثل هذا يحدث لدى مرضى التهابات السبيل البولي المتكررة، وهي توجد في ١٥% من مرضى الحصيات
- c. **حصيات حمض البول:** توجد في ٩% من المرضى وتشاهد نموذجياً بالترافق مع النقرس، لكن في ٥٠% من الحالات تحدث بدون وجود فرط حمض البول في الدم
- d. **حصيات السيستين:** توجد في ١% من المرضى، تحدث في مرضى لديهم فرط السيستين الناجم عن خطأ وراثي في الاستقلاب

٢. اختلاطات الحصيات البولية تتضمن:


- a. القولنج البولي (بسبب انحسارها في الحالب)
- b. استسقاء الحالب واستسقاء الكلية (بسبب انسداد المخرج البولي)
- c. الأخماج (متعلقة بأذية المخاطية والانسداد)

د. حبيب جربوع



ارتفاع حمض البول في الدم يسبب توضع توفات من حمض البول في لب الكلية

د. حبيب جربوع



توضع بلورات حمض البول في خلال مشكلة توفات محاطة بالتهاب نموذج ضد
جسم أجنبي مع ارتشاح بخلايا وحيدات النوى وتليف

د. حبيب جربوع

VIII. تنشؤات الكلية والسبيل البولي

A. أورام الكلية:

١. **ورم ويلمس (نفروبلاستوما):** هو ورم خبيث ينشأ من أرومة الكلية. ذروة حدوثه عند الأطفال بين ١-٣ سنوات. يعالج جراحياً ويتبعها علاج كيميائي. نسبة البقيا لخمس سنوات أكثر من ٩٠%

٢. **كارسينوما الخلية الكلوية:** تشتق من خلايا الأنابيب البولية وهي أشيع أورام الكلية عند البالغين. هذا التنشؤ يشاهد عادة عند الرجال بين الـ ٥٠-٧٠ سنة. الورم معند على العلاج الكيميائي ونسبة البقيا لخمس سنوات ٤٥%

a. الموجودات السريرية: تتنوع الأعراض لكن الثلاثي المعروف (بيلة دموية وألم خاصرة وكتلة) توجد فقط في ١٠% من المرضى

b. الاختلاطات: تتضمن الانتقالات الدموية التالية لغزو الوريد الكلوي

د. حبيب جربوع

٣. **كارسينوما الخلية الانتقالية لحويضة الكلية:** أورام صغيرة جيدة التمايز تترافق مع بقيا لخمس سنوات بنسبة ٧٠%، لكن الأورام غير المتميزة أكثر خباثة

ملاحظة: ٥٠% من كارسينوما الخلية الانتقالية تكون متعددة البؤر

B. **أورام المثانة:** وهي أشيع أورام السبيل البولي. في ٩٠% من الحالات تكون كارسينوما خلية انتقالية، الحالات الباقية كارسينوما شائكة أو أدينوكارسينوما. عادة المريض يكون رجل عمره بين ٥٠-٨٠ سنة

١. **العوامل المؤهبة:** تتضمن التدخين والتعرض لصبغة الأنيلين

٢. **الموجودات السريرية:** تتضمن بيلة دموية وعسر تبول وتأثير الكتلة في منطقة الحوض أو في أماكن النقال أو كلاهما

٣. **العلاج:** جراحي، لكن يمكن أن يكون بحقن الأدوية السامة للخلايا ضمن المثانة أو بالمعالجة المناعية بحقن الـ BCG ضمن المثانة

د. **حبيب جربوع**

٤. **الإنذار:** يعتمد على الدرجة النسيجية. نسبة البقيا لخمس سنوات تتراوح من ٩٠% في مرضى أورام الدرجة الأولى إلى ٣٠% في مرضى أورام الدرجة الثالثة


C. أورام الحالب (Ureter) والإحليل (Urethra): هي كارسينوما خلية انتقالية وهي نادرة في هذه الأماكن. الانسداد يعتبر عرض باكر

د. حبيب جربوع




كلية طفل عمره ٤ سنوات تحوي كتلة مفصصة بيضاء. هذا ورم ويلمس في الكلية. بعضها له ارتباط مع خلل جيني في الصبغي ١١. يأتي الطفل بقصة ضخامة بطن بسبب تأثير الكتلة. نسبة البقيا ٥ سنوات ٩٠ %

د. حبيب جربوع




ورم ويلمس يتألف من جزر وصفائح من خلايا زرقاء غامقة التلون تضغط برانشيم الكلية الطبيعي

د. حبيب جربوع




ورم ويلمس يشابه النفرونات الجنينية للكلية. الورم يبدي محاولة لتشكيل البنى
الكبية والأنبوبية الابتدائية

د. حبيب جربوع




كارسينوما خلية كلوية ناشئة في القسم السفلي للكلى، محدودة جيداً، سطح قطعها يبدي مظهر متغاير مع مناطق صفراء ومناطق بيضاء ومناطق بنية ومناطق نازفة حمراء. بالرغم من كون هذه الأورام بطيئة النمو إلا أنها تصل لأحجام كبيرة قبل اكتشافها لأن هناك مساحة كبيرة لنموها خلف البريتوان ولوجود كلية أخرى تقوم بالوظيفة الكلوية. الأعراض والعلامات تتضمن ألم خاصة وتأثير كتلة وبيلة دموية

د. حبيب جربوع




كارسينوما خلية كلوية تقيس حوالي ١٥ سم. جزء الكلية الطبيعية يبرز من الأسفل

د. حبيب جربوع



كارسينوما الخلية الكلوية تميل لأن تغزو الوريد الكلوي ويمكن أن تغزو محفظة الكلية، وهي يمكن أن تنتقل إلى أماكن غير اعتيادية، وفي حوالي ربع الحالات يكون المظهر الأول هو النقائل

د. حبيب جربوع



كارسينوما الخلية الكلوية. الخلايا التنشؤية هيولها رائقة ومرتبة بشكل جزر يفصل بينها أوعية دموية، لذلك تدعى الكارسينوما رائقة الخلايا

د. حبيب جربوع



مثانة مستأصلة من رجل لديه قصة تدخين منذ زمن طويل أتى حالياً ببيلة دموية.
التشخيص كارسينوما خلية انتقالية TCC والتي يمكن أن تحدث في أي مكان من
الظهارة البولية وتكون عادة متعددة البؤر وتميل للنكس

د. حبيب جربوع




الكؤيسات تبدي كتل بؤرية من أورام حللمية لكارسينوما خلية انتقالية

د. حبيب جربوع




كارسينوما خلية انتقالية في حويضة الكلية وتغزو البرانشيم. البيلة الدموية عرض شائع

د. حبيب جربوع



كارسينوما خلية انتقالية تبدي اندفاعات إصبعية حليمية الشكل، وهي هنا جيدة التمايز

د. حبيب جربوع



كارسينوما خلية انتقالية تشابه الظهارة البولية لكن ثخانة الطبقات أكثر من الطبيعي
والخلايا تبدي تعدد أشكال

د. حبيب جربوع