الكَظَر

عضو خلف البريتوان ، يميل للإصفرار و يقع فوق قمة الكلية ، يزن 4-5 غ و بأطوال 4×2,5×1 سم، و يحاط مع الكلية باللفافة الكلوية ، و يفصله عن الكلية بالشحم حول الكلية .

التروية الشريانية من ثلاثة شرايين ، من الشريان الحجابي السفلي و من الأبهـر و الشريان الكلوي .

العود الوريدي : في الأيسر إلى الوريد الكلوي الأيسر و في الأيمن إلى الأجوف السفلي ، أما التصريف اللمفي إلى العقد جانب الأبهـر الوحشية و يأتيها تعصيب ودي و نظير ودي

يتألف كل كظر من قشر و لب و القشر يتضمن ثلاث طبقات (الحزمية – الحبيبية – الشبكية) و تفرز القشرانيات المعدنية مثل الألدستيرون و القشرانيات السكرية و الأندروجينات ، أما اللب فيفرز الإبي نفرينات

CRH: الهرمون المحرر للكورتوتروبين: يتحرر من الوطاء الأمامي و يسبب تحرر ACTH من النخامى الأمامية

ACTH: الهرمون الموجه القشري الكظري: يتحرر بشكل طبيعي من النخامى الأمامية ، و الذي يسبب بدوره تحرر الكورتزول من الغدة الكظرية ، و التلقيم الراجع الذي يثبط إفراز ACTH هو الكورتزول

متلازمة كوشينغ (Cushing Syndrome) : إنتاج زائد للكورتيزول و السبب الأشيع هو علاجي المنشأ (يعني وصف البريدنيزون) و السبب الثاني هو داء كوشينغ (متلازمة كوشينغ ناجمة عن إنتاج زائد ل ACTH من النخامى الأمامية ، و مصدر ACTH المنتبذ من ورم غير موجود في النخامى يفرز ACTH ، و الذي يسبب بدوره تحرر الكورتيزول من الغدة الكظرية بدون حلقة التلقيم الراجع السلبي الطبيعي

الأعراض و العلامات : البدانة الجذعية ، الشعرانية ، الوجه البدرى ، العد ، خطوط ارجوانية ، فرط التوتر الشرياني ، الداء السكري ، الضعف ، الإكتئاب ، سهولة التكدم ، الإعتلال العضلي

التشخيص : قياس كورتيزول البول أو منتجات تحطم الكورتيزول (17- هيدروكسي كورتكوستيروئيد في البول) و قياس مستوى الكورتيزول المصلي (أعلى في الصباح و أخفض في الليل عند الأصحاء) ، الكهارل و اختبار التثبيط بالديكساميتازون منخفض الجرعة (الديكساميتازون هو كورتيزول صناعي يؤدي لتلقيم راجع سلبي على إفراز ACTH و بالتالي على إفراز الكورتيزول عند الأصحاء . مرضى متلازمة كوشينغ لا يثبطون إفرازهم من الكورتيزول ، و معايرة ACTH البلازمي

المرضى الأصحاء : الكورتزول و ACTH طبيعية ، تثبيط بالديكساميتازون منخفض الجرعة أو عالي الجرعة (> 1/2

داء كوشينغ فرط إفراز ACTH النخامي : الكورتزول و ACTH مرتفعة ، لا يتثبط بالجرعة المنخفضة للديكساميتازون ، ، و يتثبط بالديكساميتازون عالي الجرعة و العلاج استئصال الورم الغدي عن طريق الوندري

الورم الكظري : **كورتزول عالي ، ACTH منخفض** ، لا يتثبط باختبار الديكساميتازون منخفض الجرعة أو عالي الجرعة و العلاج استئصال الكظر (دائماً تقريباً أحادي الجانب)

= الإختبار المجري في حال النتائج الملتبسة لتفريق المصدر النخامي عن ورم ACTH المنتبذ هي عينة الوريد الصخري ثنائي الجانب ، خاصةً مع تسريب CRH ، و إن الموضع الأشيع للورم المنتج ACTH المنتبذ فإن < ٦٦% في الرئة و بعده الكارسينويد و العلاج الإستئصال الجراحي إذا أمكن

-الكورتزول يجب أن يعطى للمريض الخاضع لتصحيح جراحي لمتلازمة كوشينغ و عادةً هيدروكورتيزون حتى يستأنف الوارد الفموي

- الأدوية المثبطة لإنتاج الكورتزول (كيتوكونازول ، مضاد الإختلاجات -الأمينوغلوتيتاميد ، الميترابون ، الميتوتان : يمكن استعماله لإستئصال الكظر الطبي)

متلازمة نيلسون Nelson: ورم غدي نخامي وظيفي منتج ACTH زائد و تأثير كتلي مسبب لإضطرابات بصرية ، فرط تصبغ ، انقطاع الطمث ، مع ارتفاع مستويات ACTH

و تحدث في 10% من المرضى بعد استئصال الكظر ثنائي الجانب

الورم العرضي الكظري (Adrenal Incidentaloma) :

ورم يكتشف في الغدة الكظرية بالصدفة على CT منفذ لسبب غير متعلق به ، و أكثر من 75% من الحالات ورم غدي لا وظيفي

التشخيص التفريقي للورم العرضي : ورم غدي غير وظيفي - ورم القواتم - السرطانة القشرية الكظرية - الداء النقلي - فرط التنسج العقيدي

و في حالة أي كتلة كظرية و قبل إجراء الخزعة أو الجراحة على الكظر يجب استبعاد ورم القواتم (جمع بول 24 ساعة لتحري الكاتيكول أمين ، VMA ، الميتانفرين)

و إن عامل الخطر لحدوث السرطانة في حالة الورم الصلب < 6 سم قطراً .

العلاج : الإستئصال مستطب لعلاج الأورام العرضية الصلبة < 6 سم قطراً بسبب خطر التسرطن

و الأورام > 6 سم في حالة ورم مفرط الوظيفة أي فعال هرمونياً ، او آفة كيسية متضخمة

ورم القواتم Pheochromocytoma : ورم اللب الكظري < 90% و العقدة الودية (من خطوط الخلايا الكرومافينية) و التي تنتج الكاتيكول أمينات (النورأدرينالين < الأدرينالين) و يحدث في أي عمر عند الأطفال و البالغين و العمر الوسطي 40-60 سنة . و المواضع الأخرى لورم القواتم في المنصف ، المثانة ، الصفن

و نسبة المرضى المصابين بالخبائة 10% ، و قاعدة العشرات الكلاسيكية في ورم القواتم (10% خبيثة ، 10% ثنائية الجانب ، 10% عند الأطفال ، 10% أورام متعددة ، 10% خارج الكظر) و في مريض ورم القواتم يجب نفي MEN-2 (كل الحالات تقريباً تكون ثنائية الجانب

عوامل الخطورة المرافقة : MEN-2 ، القصة العائلية ، داء فون ريكلنهاوزن

الأعراض و العلامات : الثلاثي الكلاسيكي (الخفقان - الصداع - تعرق غزير نوبي)

أيضاً فرط توتر شرياني (50 %) ، شحوب ، قلق ، نقص الوزن ، تسرع القلب ، فرط غلوكوز الدم

التشخيص التفريقي : فرط توتر شرياني وعائي كلوي ، الإيلاس ، الشقيقة ، متلازمة الكارسينويد ، طليعة الإرتجاج ، ورم الأرومة العصبية ، اضطراب القلق مع نوب هلع ، فرط نشاط الدرق ، الأنسولينوما

التشخيص : تحليل حمض الفينيل مانديك (VMA) ، ميتانفيرين ، و النورميتانفيرين (نواتج تفويض الكاتيكولامينات) ، مستويات الإبي نفرين و النورإبينفرين في المصل و البول

فرط غلوكوز الدم ناتج عن الإبي نفرين و نقص الأنسولين ناتج عن النورإبي نفرين

الطبقي المحوري و الرنين المغناطيسي من أجل تحديد الورم و المادة إيودين 131ميتا إيودوبنزيلغوانيديين و هو مشابه للنورإبي نفرين حيث يتجمع في الحويصلات الكظرية و بذلك في أورام القواتم

PET و NP-59 (مشابه الكوليسترول) عند ورم القواتم في القشر الكظري

و يمكن كذلك تحديد موضع الورم عند عدم مشاهدته بالوسائل السابقة بأخذ عينة وريدية من الأجوف السفلي للبحث عن الكاتيكول أمينات (يساعد المدروج في تحديد موضع الورم)

العلاج : العلاج الطبي قبل الجراحة و يجب البدء بالعلاج مباشرة بعد وضع التشخيص بإعطاء حاصرات β مثل فينوكسي بنزامين أو برازوسين و التي تنقص التقبض الوعائي المحرض بالكاتيكول أمين

العلاج الجراحي : إستئصال الورم مع ربط مبكر للنزح الوريدي (تقليل إمكانية تحرر الكاتيكول أمين و التقليل من تحريك الغدة

الإختلاطات الممكنة في الفترة المحيطة بالجراحة : صعوبة تخديرية : نوبة فرط توتر شرياني عند تحريك الورم و يعالج بالنتروبروسيد ، و هبوط التوتر عند الإستئصال التام للورم ، و اضطرابات النظم القلبية

متلازمة كون Conn Syndrome :

فرط ألدوستيرون الدم البدني بسبب إنتاج زائد للألدوسترون و يسبب الألدوسترون احتباس الصوديوم لمبادلتة مع البوتاسيوم في الكلية ، مما يسبب احتباس السوائل و ازدياد BP

الأسباب : ١- ورم غدي كظري (٦٦ %) ٢- فرط تنسج كظري مجهول السبب ثنائي الجانب (٣٣ %) ٣- سرطان كظري (> ١ %)

أما فرط الألدوستيرونية الثانوي : فهي فرط ألدوسترون الدم الناجم عن مستويات الرينين العالية بشكل غير طبيعي (يزيد الرينين الأنجيوتنسين / الألدوسترون)

الأعراض و العلامات : المفتاحان الكلاسيكيان لمتلازمة كون هما : ١- فرط توتر شرياني و خاصةً الإنبساطي ٢- نقص بوتاسيوم الدم ، و من الأعراض الصداع ، بوال ، ضعف

التشخيص : الرينين طبيعي أو منخفض ، و تركيز الألدوسترون البلازمي و نسبة الألدوسترون إلى الرينين < 30

CT ، و أخذ عينة وريدية كظرية لتحري مستويات الألدسترون و تسريب السوائل حيث يخفض مستويات الألدسترون عند الأشخاص الطبيعيين لكن ليس في متلازمة كون

العلاج : العلاج قبل الجراحة بالسبيرونولاكتون (مضاد للألدسترون يعمل على النبيبات الكلوية) و تعويض البوتاسيوم و علاج الورم الغدي و فرط تنسج أحادي الجانب بالجراحة بالتنظير ، أما فرط تنسج ثنائي الجانب عادةً بدون جراحة (السبيرونولاكتون)

داء أديسون Addison Disease : قصور كظري حاد ويحدث نقص إفراز القشرانيات لعدم وجود الإستجابة ل ACTH وله عدة أسباب (مناعية – نخر التهابي في الكظر أو إصابة بالسل أو سرطان أو نزف داخل الغدة ثنائي الجانب و هناك تناذر ويتزهاوس- فريديسون و يحدث نزف في الكظر و يتبع تجرثم الدم بالمكورات السحائية و كذلك استئصال الكظر ثنائي الجانب ، و يمكن أن يكون ثانوي نتيجة أمراض النخامي و الوطاء ويحدث قصور في إفراز ACTH و الذي يؤدي إلى ضمور في الغدة الكظرية)

الأعراض والعلامات : يشكو المريض من ضعف و نقص وزن و اكتئاب و اضطرابات عصبية و نفسية ، و إقياء و ألم بطني و نقص السكر و تصبغات جلدية و هبوط الضغط و اضطرابات جنسية

التشخيص : فرط بوتاسيوم الدم و نقص صوديوم الدم و نقصان القشرانيات السكرية و المعدنية في البلازما

العلاج : السوائل الوريدية السكرية و الملحية و الهيدروكورتيزون و ريدياً و نبدأ بجرعة ١٠-١٥ ملغ/كغ خلال ٢٤ ساعة و تنقص بشكل تدريجي حتى الوصول لجرعة الحماية خلال خمسة أيام .

- **التنشؤات الغدية الصماوية المتعددة MEN :**
- حالة وراثية تؤهب لتطور أورام صماوية متعددة ، و تورث بصفة جسدية سائدة
- **MEN-1 (فيرمر) :** خلل في الصبغي 11، و الأورام الأكثر شيوعاً **3P** (فرط تصنيع جارات الدرق ٩٠% _ أورام خلايا الجزر البنكرياسية ، غاسترينوما ، أنسولينوما - أورام النخامي)
- و هناك أورام أخرى مترافقة مع MEN-1 : أورام غدية كظرية و درقية
- **MEN-2a (متلازمة سيبل Sipple) :** خلل وراثي في الجينة RET
- و الأورام الأكثر شيوعاً (السرطان الدرق اللبي – ورم القواتم – فرط نشاط جارات الدرق)
- **MEN-2b (أورام عصبية مخاطية في البلعوم الأنفي ، البلعوم الفموي ، الحنجرة و الملتحمة - سرطان درق لبي - ورم القواتم – سحنة جسدية مارفانية طويل و هزيل)**
- الشكاية الهضمية الأشيع لدى هذه المتلازمة هو الإمساك الناجم عن الورم العصبي العقدي في السبيل الهضمي
- الفرق بين MEN-2a و MEN-2b : في الأول فرط تصنيع جارات الدرق أما في b : لا يوجد فرط تصنيع جارات درق و يوجد أورام عصبية ، سحنة مارفان ، قدم مسطحة .