جامعة دمشق

كلية الطب البشري

تدبير الربو القصبي (٢)

المداداة السريرية – السنة الخامسة
د. سفير حبيب

المعالجة الوقائية أو المديدة (بين النوبات)

المعالجة الوقائية (بين النوبات)

- **Corticosteroids**
- **Long-Acting bronchodilators**
 - β_2 -adrenergic agents
 - Methylxanthines
- **Cromolyn sodium/Nedocromil**
- **Leukotriene inhibitors**
- **Anti-IgE monoclonal antibodies**

الدور العلاجي لـ Glucocorticoids الاستنشاقية (1)

الدور العلاجي

□ أكثر العلاجات المضادة للالتهاب فعاليةً في الربو

آلية التأثير

□ ↓ العلامات المرضية للتهاب الطرق الهوائية المتوسطة جزئياً بتثبيط إنتاج السيتوكينات الالتهابية

□ تحسن فرط استجابة الطرق الهوائية للعديد من الوسائط الالتهابية المقبضة للقصبات بعد المعالجة المطولة فتحصر بذلك الارتكاس الآني والمتأخر تجاه الأليرجين

□ تعاكس آلياً تفعيل الخلايا الالتهابية وتقلص الوذمة الموضعية نتيجة:

- ↓ موضعي لإنتاج البروستاغلاندينات الالتهابية واللوكوترينات
- تنظيم أعلى للمستقبلات الأدرنرجية، الأمر الذي يحسن استجابة المستقبلات للأدوية المشابهة

الـ Glucocorticoids الاستنشاقية (2)

■ التأثيرات غير المرغوبة

□ تأثيرات موضعية:

- نمو المبيضات في الفم

- بحة في الصوت

- سعال نتيجة تخريش الطرق الهوائية العليا

□ التأثيرات الجهازية غير المرغوبة (نتيجة امتصاصها الجهازي الجزئي) تتعلق بالمقدار المستعمل وقدرة الغليكوكورتيكوئيد وحرائه الفارماكولوجية

الاستنشاقية Glucocorticoids

(Becotide ®) Beclomethasone dipropionate

Dosage: 200-1000 µg

يتعطل ببطء عندما يصل إلى الدوران

(Pulmicort ®) Budesonide

Dosage: 200-800 µg

يتعطل بشكل كبير بالعبور الكبدي الأولي

(Bronilide ®) Flunisolide

500-2000 µg

(Flixotide ®) Fluticasone

100-500 µg

امتصاصه ضئيل من طريق الهضم

يفضل استعماله بمقادير كبيرة استنشاقاً

يفضل استعماله عند الأطفال إذا لزم الأمر

(Azmacort ®) Triamcinolone acetonide

400-2000 µg

الـ Glucocorticoids الجهازية (1)

■ طريق الإدخال

- الفم بلعاً
- الطرق الخلالية

■ آلية التأثير

- تعمل بالآلية نفسها التي تعمل بها المستحضرات الاستنشاقية لكن الجهازية تطل بتأثيرها خلايا مختلفة

■ الدور العلاجي

- المعالجة بالـ Glucocorticoids المديدة تستعمل في العلاج الوقائي للربو المستمر الخطر

ال Glucocorticoids الجهازية (2)

■ التأثيرات غير المرغوبة

- ترقق العظم
- ارتفاع الضغط الشرياني
- الداء السكري
- تثبيط المحور الوطائي النخامي
- الساد
- الزرق
- البدانة
- ترقق الجلد يؤدي إلى تحززه
- كدمات
- ضعف عضلي
- إنتان ب herpes virus مميت (ذكر عند المرضى المعرضين لهذا الفيروس عندما يستعملون الغليكوكورتيكويدات الجهازية)

موسعات القصبات الأدرنرجية مديدة التأثير

Sustained-released albuterol ■

Salmeterol ■

Formoterol ■

طريق الإدخال ■

Inhaled □

Oral □

آلية التأثير ■

□ آلية تأثير مشابهاً β_2 قصيرة الأمد نفسها

□ تأثيرها يدوم 12 ساعة على الأقل

□ التأثيرات غير المرغوبة

تحدث القليل من التأثيرات (التثبيط القلبي الوعائي، رجفان في العضلات الهيكلية، هبوط في الضغط الشرياني) بالمقارنة مع المعالجة بطريق الفم بلعاً ولاسيما إذا كانت مشتركة مع التيوفيلين

Isoproterenol

Terbutaline

Isoetharine

Albuterol (salbutamol)

Metaproterenol

Salmeterol

(1) Methylxanthines الكزانتينات

Naturally Occurring Agents ■

Caffeine (Coffee and kola beans; tea leaves) □

Theophylline (Tea leaves) □

Theobromine (Cocoa seeds or beans) □

Synthetic Derivatives ■

Dyphylline □

Proxiphylline □

Enprophylline □

طريق الاستعمال ■

Oral or Parenteral □

الكزانتينات (2) Methylxanthines

■ آليات التأثير:

- يمكن للتوسع القصبي أن يسند إلى تثبيط الفوسفوديستراز PDI (< 10 ملغ/ليتر)

- أما الفعل المضاد للالتهاب فهو مجهول السبب ويمكن أن يحدث بتركيز منخفض (5-10 ملغ/ليتر) وهذا يمكن أن يكون نتيجة تثبيط مستقبلات الأدينوزين فتزيل التثبيط على الأدينيل سيكلاز (إتقبض الليف الأملس المعزول وإتحرر الهيستامين والبراديكينين من الخلايا البدينة)

- تشير دراسات عديدة بأن لها تأثيراً خفيفاً أو لا تملك أي تأثير على فرط استجابة الطرق الهوائية

■ الدور العلاجي:

□ يفيد الـ **theophylline** المديد (المعالجة بين النوبات) في ضبط علامات الربو المزمن ويحسن وظيفة الرئة

Methylxanthines (3)

■ تم استبدال الـ **theophylline** بشكل كبير بمشابهات β_2 والستيروئيدات القشرية بسبب النافذة العلاجية الضيقة (التركيز الفعال 10-15 ملغ/ل والتركيز السمي 20 ملغ/ل) وتأثيراتها غير المرغوبة والتداخلات الدوائية

■ التأثيرات غير المرغوبة (التركيز البلازمي < 15 ملغ/ل)

□ هضمية: غثيان وإقياء

□ عصبية : نوبات

□ قلبية وعائية : تسرع قلب ، اضطرابات نظم قلبية

□ رئوية: تنبيه مركز التنفس

يجب مراقبة عيار الـ **theophylline** عندما يتجاوز المقدار 10 ملغ/ كغ أو عندما يعاني المريض من تأثيرات غير مرغوبة لدى استعمال مقدار اعتيادي

Xanthine

Theobromine

Caffeine

Theophylline

Cromolyn (Lomudal*) and Nedocromil Sodium (Tilade*) (1)

■ طريق الاستعمال:

- Cromolyn: الاستنشاق، طريق الفم بلعاً، الارذاذ
- Nedocromil: الاستنشاق

■ آليات التأثير

- آلية التأثير غير واضحة تماماً
- هذه الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية تثبط جزئياً IgE الذي يتوسط التحرر من الخلايا البدينة
- تملك تأثيرات مثبتة لخلايا التهابية أخرى (البالعات، الأيوزينات ووحيدات النوى)
- هناك بعض الدلائل تثبت بأن هذه الأدوية تبدل وظيفة قنوات الكلور في الغشاء الخلوي

Cromolyn and Nedocromil Sodium (2)

الدور العلاجي

- يستعمل لضبط الربو الخفيف
- يستعمل للوقاية من الربو المحرض بالجهد
- تثبط الطور الباكر والمتأخر المحدث بالأليرجين المؤدي الى تحدد في الطرق الهوائية وبعد التعرض للجهد والهواء البارد الجاف وال sulfur dioxide
- لا توجد معطيات حتى الآن تثبت فعالية هذه الأدوية في إنقاص فرط الاستجابة في الطرق الهوائية
- يتطلب استعمال هذه الأدوية 4-6 أسابيع لتحديد فعاليتها

التأثيرات غير المرغوبة

- ضئيلة (سعال، تخريش صدري ، ضيق صدري ، وزيز وجفاف في الفم)

Cromolyn sodium

Nedocromil sodium

معدلات (مضادات) ال Leukotriene (1)

Montelukast, Zafirlukast ■

5-lipoxygenase inhibitor (Zileuton) ■

طريق الاستعمال: الفم بلعاً Oral ■

مثال: يعطى ال Montelukast (Singulair*) بمقدار 5-10 ملغ مرة واحدة يومياً

آلية التأثير: ■

- تحصر مستقبلات CysLT1 في الليف الأملس العضلي في الطرق الهوائية وبالتالي فإنها تثبط تأثيرات ال-cysteinyl leukotrienes التي تتحرر من الخلايا البدينة والأيزينية

- مثبطات ال 5-lipoxygenase تحصر اصطناع leukotrienes

معدلات (مضادات) الـ Leukotriene (2)

■ دورها العلاجي:

- تتصف هذه المواد بفعل موسع قصبي ضئيل فهي تخفف من العلامات والأعراض وتحسن وظيفة الرئة وتقلص تفاقم الربو

- تأثيراتها أقل من تأثير مقادير قليلة من الـ glucocorticoids الاستنشاقية وبالتالي فإن استعمالها يكون مساعداً لإنقاص مقدار الـ glucocorticoid الذي يحتاجه المريض المصاب بالربو المعتدل أو الشديد

■ **ملاحظة:** إن معدلات الـ leukotriene هي أقل فعالية من مشابهاة β_2 طويلة الأمد الاستنشاقية عندما تضاف للمعالجة

معدلات (مضادات) ال Leukotriene (3)

- التأثيرات غير المرغوبة
 - بشكل عام هذه الأدوية جيدة التحمل
 - يجب مراقبة وظائف الكبد في سياق المعالجة بالـ Zileuton (ذكرت حالات تسمم كبدي)
 - أشارت تقارير عديدة إلى حدوث متلازمة Churg-Strauss في سياق المعالجة بهذه الأدوية

تدبير الربو حسب الشدة

■ يصنف الربو القصبي حسب الشدة وتواتر الأعراض إلى:

- الربو المتقطع Intermittent asthma

- الربو المستمر الخفيف Mild persistent asthma

- الربو المستمر معتدل الشدة Moderate persistent asthma

- الربو المستمر الشديد Severe persistent asthma

تصنيف الربو حسب الشدة: المستقبل السريري قبل المعالجة

Severity	Days with Symptoms	Nights with Symptoms	PEF or FEV _{1.0}
Severe Persistent	Continual	Frequent	≤ 60%
Moderate Persistent	Daily	≥ 5/month	>60% < 80%
Mild Persistent	3-6/ week	3-4/month	≥ 80%
Mild Intermittent	≤ 2/week	≤ 2/month	≥ 80%

تدبير الربو المتقطع Intermittent asthma

- المعالجة الوقائية (بين النوبات) غير ضرورية
- معالجة الأعراض حسب الحاجة:
 - منبهات β_2 قصيرة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً بختان من الـ Salbutamol)
 - تتعلق المعالجة بشدة النوبة
- قبل الجهد أو التعرض للمحسسات: بختان من الـ Salbutamol أو الـ Nedocromil
- تجنب العوامل المحرّضة أو السيطرة عليها (المحسسات، الانتانات، المخرشات كالتبغ)

تدبير الربو المستمر الخفيف

- **المعالجة الوقائية اليومية** بمضادات الالتهاب بطريق الاستنشاق: يمكن إعطاء الـ **Beclomethasone (250 µg)** بخة أو بختان مرتان يومياً، أو الـ **Nedocromil** (بختان X 2-4 مرات يومياً)
- **يمكن - خاصة في حالة الربو الليلي - إضافة:**
 - منبهات β_2 مديدة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً الـ **Formoterol** مرة أو مرتان يومياً)
 - أو- الـ **Theophylline** ذي التحرر البطيء بمقدار **10 ملغ/كغ/اليوم (300ملغ 2X يومياً)**
 - أو - منبهات β_2 مديدة التأثير بالطريق الفموي (مثلاً الـ **Terbutaline 5 ملغ** مرتان يومياً)
 - أو - أحد مضادات اللوكوترين (**Montelukast 5-10 ملغ** مرة واحدة يومياً)
- **معالجة الأعراض حسب الحاجة:** منبهات β_2 قصيرة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً بختان من الـ **Salbutamol**، > 3-4 مرات يومياً)
- **تجنب العوامل المحرصة أو السيطرة عليها**

تدبير الربو المستمر معتدل (متوسط) الشدة

- **المعالجة الوقائية اليومية تشمل** الستيروئيدات القشرية بطريق الاستنشاق: **Beclomethasone (250 µg) 4-2** بخات مرتان يومياً
- **يضاف إلى ذلك، خاصة في حالة الربو الليلي:**
 - أحد منبهات β_2 مديدة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً **Formoterol** مرتان يومياً)
 - أو- **Theophylline** ذي التحرر البطيء
 - أو - أحد منبهات β_2 مديدة التأثير بالطريق الفموي
 - أو - أحد مضادات اللوكوترين
- **معالجة الأعراض حسب الحاجة:** منبهات β_2 قصيرة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً **Salbutamol** من **4-3** مرات يومياً)
- **تجنب العوامل المحرزة أو السيطرة عليها**

تدبير الربو المستمر الشديد

- **المعالجة الوقائية اليومية تشمل الستيروئيدات القشرية بطريق الاستنشاق:**
 - ال **Beclomethasone 2-4** بخات مرتان يومياً
 - أو - ال **Fluticasone** بخة أو بختان مرتان يومياً
- **يضاف إلى ذلك، خاصة في حالة الربو الليلي:**
 - أحد منبهات β_2 مديدة التأثير بطريق الاستنشاق (كـ **Formoterol**)
 - أو- ال **Theophylline** ذي التحرر البطيء
 - أو - أحد منبهات β_2 مديدة التأثير بالطريق الفموي
- **الستيروئيدات القشرية بالطريق الفموي (مثلاً ال **Prednisolone** بمقدار 5-20 ملغ يومياً)**
- **معالجة الأعراض حسب الحاجة: منبهات β_2 قصيرة التأثير بطريق الاستنشاق (مثلاً ال **Salbutamol**، > 3-4 مرات يومياً)**
- **تجنب العوامل المحرزة أو السيطرة عليها**

IgE Antibodies

الأجسام الضدية Anti-IgE

- هي عوامل موجهة لإنقاص إنتاج IgE بتأثيرها على الـ interleukin 4 أو على الـ IgE نفسه
- الأجسام الضدية المحضونة وحيدة النسيلة تشكل معقدات مع الـ IgE الحرة (rhuMAb or omalizumab) فتمنع تداخلها مع الخلايا البدينة والأسسة
- تخفف الطور الباكر والمتأخر لانسداد الطرق الهوائية كجواب للمحسسات وتقلص تراكم الحمضات في الطرق الهوائية

Illustration: Seward Hung

Figure 4. Rationale for anti-IgE therapy as treatment of food allergy is that clearance of circulating IgE will eventually clear IgE from mast cell surfaces. Before the therapy (left), IgE has circulating and anchored moieties in constant interchange, through which the immune system equips mast cells with the means of degranulating in response to cross-bridging by allergen.

Anti-IgE binds to IgE at the site the immunoglobulin could otherwise use to anchor itself (right). After about four months of monthly injections, circulating IgE has been depleted, and any IgE leaving a mast cell surface is likely to be cleared before it can reanchor itself anywhere. Mast cell expression of IgE receptors appears to decline proportionately.

10/05/2016

طرق استعمال الأدوية

Inhaled ■

Metered dose inhalers (MDI) □

“Spacers” ■

Dry powder inhalers (DPI) □

Nebulized (“wet”) aerosols □

Oral ■

Parenteral ■

Subcutaneous □

Intramuscular □

Intravenous □

Canister

Actuator

Metering valve

Actuator seat

Mouthpiece

Propellant with micronized drug suspension

Valve stem

Aerosol

Spiral-path mouthpiece

Inhalation channel

Rotating dosing disk

Drug reservoir

Air inlet

Turning grip

Beta2-Selective Drugs

10/05/2016

Peak Flow Meter

Key Points

- **Corticosteroids:** Most potent and effective anti-inflammatory medication currently available
- **Cromolyn sodium and nedrocromil:** Mild-to-moderate anti-inflammatory medication.
- **Leukotriene inhibitors:** May be considered an alternative therapy to low dose inhaled corticosteroids or cromolyn sodium or nedrocromil for patients >12 years of age with mild persistent asthma.

Key Points

- **Long-acting beta₂-agonists:** These drugs are typically used concurrently with anti-inflammatory medications for long-term control of symptoms, especially nocturnal symptoms.
- **Methylxanthines:** Sustained release theophylline is a mild-to-moderate bronchodilator used principally as an adjuvant to inhaled corticosteroids for prevention of nocturnal asthma symptoms.