




دورات الباطنة الخمجية



ملحق

الباطنة الخمجية | Infectology

RB Medicine

دورة 2015

الدكتور نزار الزاهر

الأسئلة مرتبة حسب ترتيب المحاضرات

A	2. في الصدمة الإنتانية واحد خطأ: A. الشفاء عفوي في معظم الحالات B. قصور الأعضاء المتعددة C. الإنتان المبكر عادة عكوس D. تشيع الإصابة بالفطور عند المرضى E. تشيع الإصابة بالجراثيم إيجابية الغرام في القناطر الوعائية والحرث والحقن الوريدية	1. في متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية SIRS واحد خطأ: A. الحرارة أكثر من 38 وأقل من 36 درجة B. سرعة القلب أكثر من 120 د C. معدل التنفس أكثر من 20\د D. تعداد البيض أكثر من 12 ألف أو أقل من 4000 E. سبب إنتاني أو غير إنتاني	B
A	4. في الصدمة الإنتانية واحد خطأ: A. الكاتيكولامينات تزيد من شلال التخثر ومن إطلاق الوسائط الالتهابية B. الجراثيم سلبية الغرام مسؤولة بنسبة 66٪ C. برودة الأطراف وشحوبها مع وجود الزرقعة المحيطية علامات متأخرة الظهر D. الحمى هو الظاهرة الأكثر شيوعا لدى حديثي الولادة E. الضغط الانقباضي الطبيعي في البدء لا ينفي الصدمة	3. في الصدمة الإنتانية واحد خطأ: A. لايشكل غزو الدم بالأحياء المجهرية عامل أساسي بتطور الإنتان B. الحصيل القلبي منخفض في البدء C. من العلامات المبكرة المحتملة فرط التهوية D. تشاهد الإصابة الجلدية بالأكتيما المواتية E. حصرا لدى المرضى أخماج الزائفة الزنجارية E. ارتفاع اللاكتات مشعر لسوء تروية الأنسجة والأعضاء	B

Al Kamal



0 00010504550

E	6. في أخماج المكورات العنقودية واحد خطأ: A. الانتقال عن طريق الأيدي الملوثة هو الأكثر أهمية في العدوى. B. الدمّل يصيب الغدة الجرابية مع بعض الصلابة في النسيج الجلدية في الوجه والرقبة والإبطيين والإليتين. C. التهاب الجريبات تجمع عدد من الحطاطات الحمامية من دون التهاب الجلد المحيط. D. الجمرة تصيب الجلد السميك الليفي غير المرن للنقرة والجزء العلوي من الظهر. E. المكورات العنقودية الظهرية حساسة للميثيسيلين.	5. في أخماج المكورات العنقودية واحد خطأ: A. جراثيم إيجابية الغرام بشدة. B. المكورات العنقودية الرمية تسبب أخماج السبيل التنفسي. C. المكورات العنقودية المذهبة أهم جنس إمرضا للبشر. D. تفرز ذيفانات تسبب الطفوح الجلدية. E. المكورات العنقودية الظهرية Epidermidis S تسبب أخماج القثاطر الوعائية وأدوات المداخلات الجراحية.	B
D	8. في العوامل المسببة للإسهال واحد خطأ: A. تعتبر السالمونيلا التيفية من العوامل الثاقبة B. تعتبر المتحولات الزحارية من العوامل الالتهابية C. تعتبر الشيغيلا بأنواعها من العوامل الالتهابية D. تعتبر الجيارديا لامبيليا من العوامل الالتهابية E. تعتبر الايكولاي السامة المعوية من العوامل غير الالتهابية	7. في الكزاز واحد خطأ : A. ارتفاع ملحوظ في توتر العضلات المركزية وعدم إصابة نسبية للأيدي والأقدام B. تضعف الملكات العقلية C. الضزز أو التكرز يؤدي لعسرة بلع D. التشخيص سريري بالأساس E. الحمى غير موجودة غالبا	B
C	10. في الإسهالات الناجمة عن الممرضات المعوية المفرزة للذيفان المعوي كل ما يلي صحيح ما عدا: A. لا توجد حمى أو عرض جهازى هام مرافق. B. الإسهال مائي كبير الحجم. C. تركيزه مرتفع من البروتين. D. محتواه من الشوارد يعكس مصدره. E. الحاجة لابتلاع كمية كبيرة من الجراثيم مع الطعام أو الماء الملوثن.	9. في العوامل الدفاعية في الجهاز الهضمي واحد خطأ: A. نقص PH المعدة B. بطء زمن العبور في الأمعاء الدقيقة C. الدسام الدقاقي الأعوري يمنع عودة الطعام للأمعاء الدقيقة D. المناعة الخلوية وإنتاج الأضداد IgM, IgG E. الفلورا الطبيعية تمنع تكاثر العوامل الممرضة المعوية	B

E	12. في المپثيات العسيرة Clostridium difficile واحد خطأ: A. تسبب التهاب القولون الغشائي الكاذب B. تستوطن الأمعاء الغليظة C. تفرز نوعين من اليفانات المعوية (A,B) D. تخرب المخاطية بشدة E. إسهال مائي شديد E. يحدث في الكهول والمسنين بعد نقل الدم أو التغذية البروتينية الوريدية	11. في الكوليرا واحد خطأ: A. الحضانة 1-3 أيام B. تصنف على أساس مستضداتها الجسمية C. العدوى بالماء الملوث بالبراز أو الطعام D. الإسهال مائي غزير E. يصيب المواشي والحيوانات المنزلية	E
B	14. في الحمى التيفية واحد خطأ: A. السبب القريب والمباشر الماء وهو الطريق الأكثر شيوعاً أو الطعام الملوث B. إيجابية زرع البراز في الأسبوع الأول. C. النزف والانتقاب من أهم الاختلاطات. D. الدواء سفترياكسون وسيفروفلوكساسين. E. الحملة يطرحون الجراثيم في البول والصفراء بشكل متقطع.	13. في الـ Botulism التسمم الوشقي واحد خطأ: A. الشلل متناظر يتطور لوهم تنفسي B. إمساك C. شفح ونقص المطابقة D. الشلل صاعد دون موجودات حسية E. تعداد البيض طبيعي	D
C	16. في داء البروسيلة واحد خطأ: A. تعرق ليلي. B. تعداد البيض طبيعي أو تميل للانخفاض. C. يمكن أن تحصل الإصابة بالتماس المباشر مع الأنسجة المصابة. D. التهاب الخصية والبربخ. E. إن غلي الحليب لمدة 5 دقائق بعد الغليان كافية للقضاء على البروسيلة.	15. في الحمى التيفية واحد خطأ: A. فترة الحضانة (7-14) يوم. B. اختبار فيدال إيجابي. C. افتراق نبضي حروري. D. ارتفاع حروري يومي بشكل الدرجة حتى تصل إلى 40.5 E. طفح التيفية هي بقع صغيرة حمراء قطرها 3-2 ملم توجد على الأطراف بشكل رئيسي	E
D	18. في الحمى المالطية واحد خطأ: A. الضخامة الكبدية تشاهد بنسبة 15%. B. العدوى بالتماس مع الحيوانات المصابة أو مشتقاتها. C. ترتفع الـ IgM في الأسبوع الأول D. كشف الجراثيم لعدة أسابيع من المرض من خلال زرع الدم E. الأبقار والخراف مستودعات للممرض.	17. في البروسيلة كل مما يلي صحيح ما عدا: A. تفاعلات تصالبة مع الكولونيات وضمت الهضة والسالمونيلا. B. تنتقل من الأم للجنين. C. أهم الإصابات المفصلية عند الأطفال هي الحرقفي الفخذي ثم الركبة. D. ارتكاس حبيومي غير متجن. E. الخراجات تحدث في العقد اللمفاوية والفقرات القطنية.	B

B	20. في الإيدز واحد خطأ: A. يحدد اختبار viral load RNA HIV تعداد الجزيئات الفيروسية في الدم. B. يحدد عيار الأضداد مدى الاستجابة للعلاج. C. Cd4 تقل بالإصابة بالفيروس. D. غرن كابوزي المنتشر. E. التهاب الدماغ بالتكسوبلاسموز.	19. في المتدثرة التراخومية واحد خطأ: A. الخمج العيني بالمتدثرة التراخومية أحد أهم أسباب العمى. B. جراثيم داخل خلوية مجبرة إيجابية الغرام. C. تسبب التهاب الملتحمة الاشتمالي لدى البالغين الناشطين جنسياً. D. أهم طرق انتقال المتدثرة الببغائية باستنشاق الغبار الملوث أو بالتماس. E. السبب الأول لالتهاب الإحليل غير البني لدى الرجال.	B
E	22. الكلاميديا واحد خطأ: A. التهاب احليل سلبي الزرع عند الرجال B. التهاب عنق رحم مخاطي قيحي عند النساء C. داء حوضي التهابي D. التهاب كولون ومستقيم عند اللوطيين E. العلاج بنسلينات	21. في متلازمة العوز المناعي المكتسب واحد خطأ: A. مرحلة الإنتان الحاد تظهر بعد 6-8 أسابيع من الخمج بالـ HIV B. يساعد اختبار WESTERN Blot في تأكيد التشخيص. C. يجب البدء بالمعالجة المضادة لـ HIV منذ حدوث الخمج وحتى حدوث الانقلاب المصلي. D. اختبار إليزا سلبي في مرحلة الطور الحاد. E. أضداد الـ HIV متى ظهرت تبقى مدى الحياة.	A
C	24. في الخمج بالـ Haemophilus influenza واحد خطأ : A. الإنسان هو المضيف الطبيعي الوحيد B. تسهم طبيعتها المضادة للبلعمة وغياب أضداد المحفظة في زيادة التكاثر الجرثومي C. الكريات البيض ضمن الحدود الطبيعية أو تميل للانخفاض D. تنتقل بالتماس و استنشاق القطرات الملوثة E. من أهم العوامل المؤهبة للاتحالية	23. في الخمج بالـ Legionellosis واحد خطأ: A. تتكاثر في أنظمة التكييف (تعيش داخل الأوالي) B. حمى مع تسرع النبض C. تنتقل من شخص لآخر بالطريق التنفسي D. ترتفع عيار الأضداد المصلية IgM و IgG E. العلاج المفضل Azithromycin	C

E	26. في أخماج الزائفة الزنجارية واحد خطأ : A. غالبا يحدث إنتان الدم لدى مرضى المستشفيات مع أمراض مستبطنة B. نسبة الوفيات أعلى لدى المخموجين بالزوائف الزنجارية مقارنة مع المرضى المخموجين بأصناف الإمعائيات الأخرى C. تنمو في الماء المقطر ، وبعض المطهرات ، والأدوية ، وفي محاليل التغذية الوريدية D. في الإصابة الرئوية إنصباب الجنب شائع E. اليرقان أقل تواتراً من إنتانات الدم الناتجة عن الجراثيم الأخرى.	25. في أخماج الكلبسيلة واحد خطأ : A. يكثر تسببها في أخماج السبيلين التنفسي والبولي B. تبدي ذات الرئة المكتسبة في المجتمع ميلاً زائداً نحو تشكيل الخراجات C. بالتصوير الشعاعي ظهور علامة الشق المنتفخ Bulging flssure sign D. انخفاض في الكريات البيض E. تُحدث الكلبسيلة الخشمية نتن الأنف Ozenous	D
E	28. في الأخماج التالية واحد خطأ: A. العلاج المفضل للموراكسيلا Amoxicillin clavolante B. العلاج المفضل للهيوموفيليس انفلونزا سيفلوسبورينات الجيل الثالث ceftriaxone cefotaxime C. العلاج المفضل لداء الفطر الشعاعي البنسلين D. العلاج المفضل للتولاريميا , Topramicine Gentamycin E. المعالجة في داء خرمشة القطة الأميسيللين	27. في أخماج الزائفة الزنجارية واحد خطأ: A. ذات قصبات ورئة ثنائية الجانب مع ارتشاحات عقدية B. أخماج السبيل البولي غالبا مكتسبة في المستشفيات C. التشوهات البولية عوامل مؤهبة لأخماج صامته سريريا D. العلاج المفضل بالماكروليدات E. التهاب أمعاء يدعى بحمى شانغهاي	D
C	30. في التوكسوبلاسماز واحد خطأ: A. داء المقوسات العيني خلقي بأغلب الحالات. B. في الإصابة العصبية المركزية تشاهد كتل في جذع الدماغ والنويات القاعدية. C. الكلاب الثوي النهائي. D. معظم الحالات لاعرضية عند البالغين أسوياء المناعة. E. داء المقوسات الحملي ينجم عن الخمج الأولي أثناء الحمل.	29. في الملاريا واحد خطأ: A. بعد الطور الدموي تعاود المنجلية الطور خارج الحمر. B. ضخامة الطحال متزايدة، الكبد أقل ضخامة. C. الملاريا المدارية أعلى معدل إصابة للكريات الحمر. D. طور بادري لا نوعي دعت وغثيان وإقياء E. يوصف الـ Chloroquine لعلاج البيضوية أو النشيطة.	A

C	32. في فرط الوحيدات الخمجي واحد خطأ : A. العدوى عبر التماس مع لعاب المصاب وبوساطة التقبيل B. باللطاخة الدموية تشاهد اللمفاويات اللانموزجية C. اختبار الأضداد المتغايرة سلبي D. ضخامة الطحال E. ارتفاع الكريات البيض	31. في الحلاّ البسيط النمط الثاني واحد خطأ : A. الوقاية غير فعالة باستخدام الواقي الذكري B. عسرة التبول C. يبدأ التعرض للخمج بال HSV2 في سن البلوغ D. ضخامة غدد لمفاوية موضوعة E. ينتقل بشكل رئيسي بالحقن الوريدي	E
D	34. في مجموعات الخطر في النزلة الوافدة واحدة خطأ : A. الأطفال الصغار B. المرضى المسنين C. المصابين بأمراض مزمنة D. الإناث E. المرضى مضعفي المناعة	33. في النزلة الوافدة واحد خطأ: A. يبدأ المرض فجأة بعرواءات وحمى. B. تحدث Antigenic Shift نتيجة تبدلات مورثية صغيرة لا تؤثر على نمط الفيروس ولا تسبب أوبئة. C. صداع وآلام في العضلات والأعضاء. D. المناعة بين تحت الأنماط غير متصالبة. E. التمتع بإعطاء البالغين اللقاح سنوياً مع بداية الفصول الباردة من السنة.	B
A	36. في حمى الضنك (Dengue fever (DEN واحد خطأ : A. ارتفاع في تعداد الكريات البيض B. البعوض الناقل هو الزاعجة المصرية التي تعد مستودعاً C. آلام مفصليّة وعضليّة حادة D. البدء بالشكل التقليدي حمى مفاجئة ، صداع شديد ، آلام خلف المقلة تزداد بالحركة E. مصدر الخمج الثاني بالفيروس من جنوب شرق آسيا من عوامل الخطورة للإصابة بالأشكال الشديدة.	35. في ال Rabies واحد خطأ : A. حمة ذات انحياز عصبي مركزي B. المسبب لأعلى نسبة وفيات بين الأمراض الخمجية C. العرض الموجه الباكر تشوش الحس في مكان الأذية D. ارتفاعاً في البيض (20,000 – 30,000 مم³) E. خطر انتقال السعار عالي بوساطة الأدوات الملوثة باللعب	E

الدكتور وحيد رجب بك

الأسئلة مرتبة حسب ترتيب المحاضرات

C	38. الحمى الراجعة واحد خطأ: A. العامل الممرض البوريللا. B. حضانة 5-15 يوم. C. الذباب والبعوض عامل ناقل. D. حمى شديدة ويرقان وفقر دم. E. العلاج تيتراسيكلين.	37. السفلس مرض مرتبط بالجنس، واحد خطأ: A. العامل الممرض اللولبية الشاحبة B. يصيب الذكور والإناث C. التفاعلات المصلية إيجابية بعد عدة أسابيع من تاريخ الإصابة D. قرحة لينة مؤلمة بدون ضخامة عقد ناحية E. يستجيب للبنسلين	D
E	40. حمى الاستفهام واحد خطأ: A. العامل الممرض Coxiella burneti B. التهاب شغاف سلبي الزرع C. تنتقل بالحليب غير المبستر D. العلاج النوعي هو تتراسكلين E. قد تتظاهر بذات رئة فصية نموذجية	39. داء لايم واحد خطأ: A. العامل الممرض Borrelia Burgdorferi B. القراد العامل الناقل C. حمى هاجرة مكان اللدغ D. ثلاث أطوار سريرية للإصابة E. المعالجة دابسون	E
A	42. الرشاشيات واحد خطأ: A. تصيب أسوياء المناعة فقط B. داء الرشاشيات الغازي مرض خطير يؤدي بالحياة C. علاجه فوريكونازول أو أمفوتريبين D. ورم الرشاشيات علاجه جراحي E. يمكن أن تسكن الرشاشيات في كهف درني شافي	41. المفطورات Mycoplasma واحد خطأ: A. عضويات ممرضة صغيرة جداً بدون جدار. B. تصيب الجهاز البولي والتنفسي. C. ذات رئة لا نموذجية عند الكهول، التهاب قصبات عند الأطفال. D. ارتفاع LDH E. المعالجة سيفالوسبورين.	E
D	44. العلاج النوعي كريتوسبورديوم (خفيات الأبواغ) واحد صح: A. البيندازول B. تريكلابيندازول C. فوريكونازول D. نيتازوكسانيد E. برازيكواتنيل	43. المبيضات واحد خطأ: A. ذاتية المصدر B. المبيضات غير البيضاء أخطر من البيضاء C. العلاج النوعي للمبيضات البيض زمرة الأزول D. غير موجودة في الفلورا بشكل طبيعي E. علاج المبيضات غير البيض الامفوتريبين.	D

C	46. رجل أعمال مضطرب لتناول الطعام في مطاعم خارجية ، بعد وجبة من سلطات مختلفة وخضراوات غير مطبوخة مع لحم مشوي، شكى خلال يومين من آلام بطنية، نفخة وغازات مع براز مخاطي، بفحص البراز وجد مبيضات بيض وكريات بيضاء، نواشط زحارية بكثرة، علاجه (واحد صح): A. فلوكونازول 100 ملغ باليوم B. امفوتريبسين 50 ملغ/اليوم تسريب وريدي C. ميترونيدازول 500 ملغ 3x يوميا D. سبيروفلوكساسين مع أميكاسين E. سالازوبرين + فلاجيل	45. الفطار العفني mucormucosis الجواب الخطأ: A. لا يحدث بوجود مناعة طبيعية B. زرع الفطر صعب وبطيء النمو C. يبنى التشخيص على التشريح المرضي للخرعات المأخوذة من النسيج المصابة D. المعالجة بالفلوكونازول E. يصيب المسنين أكثر من الأطفال والشباب	D
E	48. داء المتورقة Faciolasis الجواب الصح : A. لا تشخص بالفحوص المصلية B. نقص الكريات البيض و IgG طبيعي C. لا يوجد يرقان D. حرارة طبيعية زيادة وزن مع حكة E. المعالجة تريكلابندازول	47. في داء الصفر الخراطيني واحد خطأ: A. لا بد لاستمرار الخمج من عدوى جديدة تحدث خلال سنتين B. يكثر ترافق الخمج مع الخمج بالأنكلوستوما والمسلكات الشعرية الذيل C. يبلغ الحمل المتوسط للديدان 14-16 دودة D. يحدث خمج حيواني المصدر ينجم عن ديدان الصفر الخنزيري التي يصعب تفريقها عن الصفر الخراطيني E. يوضع التشخيص بالاختبارات المصلية	E
B	50. رجل 40 سنة مصاب بسل رئوي فعال معالج وشافي منذ سنتين كان لديه كهف درني كبير منذ شهر، سعال مع نفث دم فقط دون حرارة صورة الصدر تبدي كثافة في الكهف الدرني السابق فحص القشع المباشر وتحري كوخ والزرع سلبي التشخيص (واحد صح): A. خراج رئوي B. ورم فطري بالاسبيرجولوس C. ذات رئة غير نموذجية D. ورم قصبي E. كيسة مائية صغيرة	49. مريضة 75 سنة سكرية تعالج بالحبوب، خضاب السكري 11 ، تكرر إنتان بولي مع معالجة مختلفة بالصادات، فحص البول بيض 200 – 300 ، زرع بول سلبي الجراثيم احتمال إصابة المريضة واحد خطأ: A. إنتان بولي باللا نموذجيات (كلاميديا) B. زرع سلبي بسبب المعالجة بالصادات C. إنتان بولي بالفطور غالبا المبيضات D. تخريش مثاني ناجم عن بلهارسيا E. سلي المنشأ	D

دورة 2014 النظامية

الدكتور نزار ظاهر

C	(2) غياب الحمى في الصدمة الإنتانية أكثر شيوعاً في كل ما يأتي ما عدا: a. حديثي الولادة. b. المرضى المسنين. c. مرضى فرط التوتر الشرياني. d. المصابين بالقصور الكلوي. e. المصابين بالكحولية.	(1) في الصدمة الإنتانية واحد خطأ: a. عند التغلب على العوامل المتسلسلة للإنتان ينقل الممرض من بؤرة الخمج إلى الدم. b. تجرثم الدم يعني وجود الجراثيم بالدم. c. في الصدمة الإنتانية يكون الحصيل القلبي طبيعياً في البدء وربما مرتفعاً. d. إنتان الدم يعني وجود الاستجابة الالتهابية الجهازية تجاه العامل الممرض ولا يشترط وجود العامل الممرض في الدم. e. يعتبر فرط التهوية علامة متأخرة فيها.	E
D	(4) في المخاطر الأكثر شيوعاً لإنتان الجروح لما بعد الجراحة واحد خطأ: a. النقص في المهارات التقنية للجراح b. وجود أمراض مزمنة مثل السكري. c. إقامة طويلة في المستشفى قبل الجراحة. d. حلاقة موقع الجراحة قبل الجراحة مباشرة. e. طول مدة العمل الجراحي.	(3) في الصدمة الإنتانية واحد خطأ: a. هبوط الضغط نتيجة الإنتان. b. زيادة في عدد الصفائح. c. ارتفاع اللاكتات elevated lactate. d. شح البول. e. الإنتان مع حبر جلدي Petechia أو فرفرية يوجه للاشتباه بالنيسرية السحائية.	B
D	(6) في المكورات العنقودية واحد خطأ: a. في خمج العنقودية المذهبة الآلية الأكثر أهمية للعدوى هي الانتقال بالأيدي الملوثة. b. بعد العصيات الكولونية تعد العنقودية الرمية أكثر سبب شائع لخمج السبيل البولي غير الانسدادي البدئي لشابة نشيطة جنسياً. c. المكورات العنقودية الظهارية أكثر العوامل الخمجية بالوسائل الواصلة لداخل الأوردة في تجرثم الدم الناتجة عن خمج المشافي. d. العنقودية المذهبة أكثر سبب لالتهاب شغاف صمام بديل. e. العنقودية الظهارية هي السبب الشائع لالتهاب داخل العين كاختلاط للجراحة العينية.	(5) في عوامل الخطر لانتشار زمر المكورات العنقودية المقاومة للميتيسلين MRSA في المشافي واحد خطأ: a. طول مدة استخدام الصادات. b. الإقامة في وحدة العناية المشددة. c. العمر أقل من 65 سنة. d. الإقامة في دور الرعاية. e. الإقامة في وحدة الحروق.	C

E	(8) في مقارنة مريض مصاب بإسهال خمجى مكتسب في المجتمع واحد خطأ: a. البراز المدمى بدون وجود كريات بيض تشير لاحتمال الخمج بذيغان المشابه للشيغلا المفرز من المعوية القولونية النزفية. b. الإسهال المائي الغزير كماء الرز يشير إلى الكوليرا. c. الألم البطني الحاد يشاهد في الشيغلا والكامبيلوباكتري. d. النفخة تشاهد في الجيارديا. e. المتلازمة الشبيهة بالتهاب الزائدة الحاد يشير إلى المطثيات الصعبة.	(7) في الإسهال الحاد الخمجى واحد خطأ: a. الفلورا الكولونية تساعد على تكاثر العوامل الممرضة المعوية. b. الإيشريشيا الكولونية السامة المعوية أكثر مسبب لإسهال المسافرين. c. سرعة زمن العبور في الأمعاء الدقيقة من عوامل الخطورة. d. لا ينصح بالصادات في الوقاية من إسهال المسافرين رغم فعاليتها. e. الإسهالات الناجمة عن الممرضات المعوية المفرزة للذيفان المعوي لا تترافق مع حمى عادة.	A
D	(10) في الجيارديا واحد خطأ: a. الإسهال قد يستمر عدة أسابيع أو أشهر. b. المعالجة albendazole أو الميترونيدازول. c. الكلاب والقطط والأبقار والأغنام تلعب مصدراً للخمج البشري. d. الإسهال يترافق مع الدم أو المخاط أو القيح ورائحة كريهة. e. الشعور بالامتلاء بعد الوجبات.	(9) في الزحار العصوي واحد خطأ: a. يمتزج بالبراز الدم والمخاط وبعض القيح. b. انتقال المرض عبر المياه الملوثة يكثر شيوعه في البلدان النامية. c. المرض غالباً عرضي عند البالغين ذوي المناعة المكتسبة وغير عرضي عند الأطفال غالباً. d. العدوى مباشرة في دور الرعاية وحمام السباحة الملوثة. e. المستودع الوحيد للإنسان.	C
A	(12) تشاهد علامة فاجيت (افتراق النبض والحرارة) في كل مما يلي ما عدا: a. الحمى المالطية. b. داء البغاء (المتدثرى الببغائية). c. الحمى الصفراء. d. الليجيونيلا. e. الحمى التيفية.	(11) في الحمى التيفية واحد خطأ: a. الصداع الشديد. b. مخطط الحرارة يرتفع بشكل تدريجي. c. الطفح الوردي خاصة على الأطراف. d. افتراق نبضي - حروري. e. ينخفض تكرار المضاعفات بالاستعمال الفوري للصادات.	C

B	(14) في داء البروسيلات واحد خطأ: a. المفصل الحرقفي الفخذي أكثر المفاصل المحيطة عرضة للإصابة. b. الفقرات الرقبية أكثر الفقرات عرضة للإصابة. c. تعداد الكريات البيض طبيعي أو منخفض. d. في الإصابة الحادة ترتفع كل من IgM و IgG خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الخمج. e. إعطاء دواء وحيد في العلاج يؤدي إلى فشل العلاج ونسبة النكس العالية.	(13) في معايير لتشخيص داء خرمشة القطعة واحد خطأ: a. اعتلال عقد لمفاوية موضّع بغياب العوامل الممرضة والأخماج النوعية b. قصة للتماس مع القطط والكلاب (قصة عض أو خرمشة حيوان) c. اندفاع التهابي حطاطي محمر غير حاك d. أذية جلدية أولية ناجمة عن القطط أو وجود التهاب ملتحمة أولي e. كثرة البيض.	E
D	(16) في خمج الذكور بالمكورات البنية (الخطأ): a. عسر التبول واحمرار الصماخ. b. مفرزات قيحية إحليلية. c. ينذر حدوث التهاب موثة. d. علاج الأخماج غير المختلطة دوكسيسيكليين. e. في خمج البنات المنتشر التهاب مفاصل تقحي في المعصمين، الركبتين والمرفقين.	(15) في المشاهدات الرئيسية في الإيدز واحد خطأ: a. غرن كابوزي المنتشر b. التهاب الرئة بالمتكيسات الرئوية الكارينية. c. التهاب الدماغ بالتوكسوبلاسموز d. التهاب السحايا بالمكورات الرئوية e. التهاب الشبكية بال CMV.	D
E	(18) في الكليسييلات واحد خطأ: a. المركز الثاني في ترتيب أخماج سلبيات الغرام المستشفوية بعد الإيشريكيات القولونية. b. الانتقال عبر الهواء لا يعد عاملاً مهماً في نقل الخمج بجراثيم الكلبسيلا داخل المستشفى. c. بالتصوير الشعاعي للرئتين الفص منتفخ مع ظهور علامة الشق المنتفخ Bulging fissure sign. d. K. الخشمية تسبب التهاب الأنف الضموري وتن الأنف. e. تعداد الكريات البيض طبيعي أو منخفض.	(17) الكلاميديا، واحد خطأ: a. التهاب إحليل بني عند الرجال. b. التهاب عنق رحم مخاطي قيحي عند النساء. c. داء حوضي التهابي. d. التهاب كولون ومستقيم عند اللوطيين. e. العلاج ماكروليد.	A

B لم يعط هذا العام	(20) في أخماج الباستوريلا Pastorellosis واحد خطأ: a. يتوضع داء الباستوريلا الرئوي في الطرق التنفسية السفلية. b. الأعراض العامة شديدة على نقيض الموضعية القليلة. c. تنتقل بالجروح الناجمة عن عضات وأذيات الكلاب والقطط. d. السير انسمامي شديد لدى مضعفي المناعة e. المعالجة الدوائية ب Amoxicillin - Clavulanate	(19) في الخمج بالمكورات السحائية واحد خطأ: a. استئصال الطحال عامل خطورة للتعرض المتكرر لتجرثم الدم بالمكورات السحائية. b. ينتقل عن طريق التماس مع المفرزات التنفسية. c. في التهاب السحايا: البدء مفاجئ مع حمى وصداع شديد. d. القسط مصدر الخمج البشري. e. الطفح المرفق للحمى يتميز بعدم زواله بالضغط عليه (glass test).	D
D	(22) في الخمج بالليجونيا واحد خطأ: a. تتكاثر في أنظمة التكييف. b. حمى قد تتجاوز 40 مع افتراق نبضي حروري. c. تنتقل كخمج قطيري منقول بالهواء. d. المعالجة بالسيفترياكسون. e. وجود الكُرات البيضاء المفصصة النوى العدلة في عينات القشع بغياب الجراثيم.	(21) في أخماج السيراتيا Serratia واحد خطأ: a. أمكن عزلها من الإنسان والحيوانات. b. تصنف كأخماج مكتسبة داخل المستشفى. c. أخماج السبيل الهضمي أكثر الأخماج مشاهدة عند البالغين. d. معندة عادة على الأمبيسيلين. e. يمكن أن تنمو في بعض المطهرات، وفي محاليل للتغذية الوريدية.	C
C	(24) في الملاريا المدارية واحد خطأ: a. بعد الطور الدموي لا تعاود المنجلية الطور خارج الحمر. b. الحالات الشديدة الحمى قصيرة الأمد. c. سرعة التثفل ضمن الحدود الطبيعية. d. أعلى معدل إصابة للكريات الحمر e. كريات بكيلة Poikilocytosis	(23) في الخمج بالهيموفيليس إنفلونزا واحد خطأ: a. تؤدي أضرار محفظة النمط b دوراً رئيساً في المناعة. b. الإنسان هو المضيف الوحيد. c. تنتقل بالتماس، استنشاق القطرات الملوثة. d. كثرة البيض مع فرط الصفائح e. المعالجة بال دوكسي سيكلين.	E
A	(26) في إصابة النساء بالحلا البسيط النمط الثاني واحد خطأ: a. الوقاية فعالة باستخدام الواقي الذكري. b. عسرة تبول. c. النكس في النمط الثاني أكثر من الأول. d. ضخامة غدد لمفاوية موضعة. e. قد ينتقل من الأم إلى وليدها حول الولادة.	(25) تعتبر الأمراض التالية من أهم الأمراض المنتقلة بالجنس ما عدا: a. السيلان البني. b. السفلس. c. الأيدز. d. المشعرات المهبلية. e. الليجيونيا.	E

C	(28) في الحمى المضخمة للخلايا واحد خطأ: a. يشك أنه مولد للخبثات. b. المعالجة بالغانسيكلوفير. c. الصورة الدموية تبدي زيادة الكريات البيض. d. يمكن عزلها من (الحليب، اللعاب، البراز،مني e. الخمج داخل الرحم بالـ CMV من أكثر الأحماء داخل الرحم تواتراً.	(27) في الحلا البسيط النمط الأول واحد خطأ: a. يبدأ التعرض للخمج في سن البلوغ b. يتواجد الفيروس في سائل الحويصلات. c. بقاء مديد في خلايا الهدف في حالة توازن. d. يمكن للخمج أن يتفعل من جديد عند حدوث ضعف مناعي. e. ينتقل الحلا النمط الأول كخمج فموي.	A
B	(30) في التوكسوبلاسموس واحد خطأ: a. عدوى الإنسان عن طريق الفم بتناول مشتقات غذائية حيوانية نيئة وغير المطهورة. b. داء المقوسات العيني تشيع عند البالغين سويي المناعة. c. تتسم البيوض المكتسبة المتبوعة بمقاومتها الشديدة d. في الإصابة العصبية المركزية تشاهد كتل في جذع الدماغ e. داء المقوسات الحلمي ينجم عن الخمج الأولي أثناء الحمل	(29) في داء فرط الوحيدات الخمجي واحد خطأ: a. العامل المسبب فيروس إيشتاين بار EBV من الفيروسات الحلئية. b. الخلايا الهدف هي الخلايا الظهارية للفم والبلعوم والخلايا اللمفاوية B. c. إصابة الجنين ذات إنذار سيئ. d. ترافق الخمج بمتلازمة بلعمة الكريات الدموية. e. يحدث مرض قاتل لدى المصابين بمتلازمة بورتيлио.	C
E	(32) في الفيروسات الغدية Adenoviridae واحد خطأ: a. مقاومة نوعاً ما لظروف البيئة. b. تعبر السبيل الهضمي دون أن تتخرب c. الانتقال عبر الهواء بواسطة القطيرات d. تسبب التهاب طرق التنفسية حاد والحمى الملتحمة البلعومية e. المعالجة بالأسيكولوفير.	(31) في النزلة الوافدة واحد خطأ: a. البدء تدريجي بحمى نمط السلم. b. يجري التمنيع بإعطاء البالغين جرعة اللقاح سنوياً مع بداية الفصول الباردة من السنة. c. صداع وآلام في العضلات والأعضاء. d. سرعة التثفل وتعداد البيض ضمن الحدود الطبيعية. e. التهاب قصبات ورغامى مع سعال جاف.	A
E	(34) في عوامل الخطورة المؤهبة للإصابة بالأشكال الشديدة لحمى الضنك DSS/DHF واحد خطأ: a. عدم تكوين الخمج الراهن لأضداد محصنة. b. النساء. c. العرق الأبيض أو الآسيوي. d. الأطفال واليفعان. e. مصدر الخمج الثاني به من أمريكا الجنوبية.	(33) في التهاب الأنف الفيروسي الحاد واحد خطأ: a. ذروة الحدوث في فصلي الخريف والشتاء. b. عند الأنماط المصلية كبيراً. c. الحمات الأنفية شديدة العدوى تنتقل عبر القطيرات الملوثة من إنسان إلى آخر. d. يوجد تصالب مناعي بين الأنماط المصلية e. المعالجة عرضية.	D

B	(36) في النزلة الوافدة واحد خطأ: a. سرعة التثفل وتعداد البيض ضمن الحدود الطبيعية. b. تحدث Antigenic shift نتيجة تبدلات مورثية صغيرة لا تؤثر على نمط الفيروس ولا تسبب أوبئة. c. يقوم الخمج الجرثومي في الطرق التنفسية العلوية بتمهيد الطريق لإحداث ذات رئة نزلية. d. المناعة بين تحت الأنماط غير متصالبة. e. التمتع بإعطاء البالغين اللقاح سنوياً مع بداية الفصول الباردة من السنة.	(35) في السعار (داء الكلب) Rabies واحد خطأ: a. يعتبر المسبب لأعلى نسبة وفيات بين الأمراض الخمجية. b. خطر انتقال السعار بواسطة الأدوات والمواد الملوثة باللعب قليل. c. العرض الموجه للسعار المذل في مكان الأذية الناجمة عن العض d. لعاب الحيوان المخموج خلال العض يصبح معدياً بعد أسبوع من ظهور الأعراض للمرض e. الشكل المدني الحضري ينجم عن عضات الكلاب المنزلية والقطط	D
		(37) رجل أعمال مضطر لتناول الطعام في مطاعم خارجية، بعد وجبة من سلطات مختلفة، وخضروات غير مطبوخة مع لحم مشوي، شكى خلال يومين من آلام بطنية، نفخة وغازات، مع براز مخاطي، فحص البراز بين وجود مبيضات بيض، كريات، نواشت زحارية بكثرة، علاج المريض (واحد صح): a. فلوكونازول 100 ملغ باليوم b. أمفوتيريسين B 50 ملغ/اليوم تسريب وريدي c. مترونيدازول 500 ملغ 3× يومياً d. سيبروفلووكساسين مع أميكاسين. e. سالازوبرين + فلاجيل.	C

الدكتور وحيد رجب بك

B	(39) السفلس مرض مرتبط بالجنس، واحد خطأ: a. العامل الممرض اللولبية الشاحبة. b. التفاعلات المصلية إيجابية من تاريخ الإصابة. c. يصيب الذكور والإناث. d. قرحة صلبة غير مؤلمة مع ضخامة عقد ناحية. e. يستجيب للبينيسيلين.	(38) داء لايم، واحد خطأ: a. العامل الممرض borreliaburgdorferi b. القراد العامل الناقل. c. حمى هاجرة مكان اللدغ. d. أربع أطوار سريرية للإصابة. e. المعالجة تيتراسيكلين.	D
---	--	---	---

D	(41)المفطورات Mycoplasma، واحد خطأ: a.عضويات ممرضة صغيرة جداً بدون جدار. b.تصيب الجهاز البولي والتنفسي. c.ذات رئة لا نموذجية عند الكهول، التهاب قصبات عند الأطفال d.انخفاض LDH e.المعالجة ماكروليد.	(40) الحمى الراجعة، واحد خطأ: a.حضانة 5 – 15 يوم. b.القمل والقراد عامل ناقل. c.العامل الممرض البريميات. d.حمى شديدة ويرقان وفقر دم. e.العلاج تيتراسيكلين.	C
B	(43)رجل 40 سنة مصاب بسل رئوي فعال معالج وشافي منذ سنتين، كان لديه كهف درني كبير، منذ حوالي شهر سعال ع نفث دم فقط دون حرارة، صورة الصدر تبدي كثافة في الكهف الدرني السابقة، فحص القشع المباشر وتحري كوخ والزرع سلبي، التشخيص (واحد صح): a.خراج رئوي. b.ورم فطري الأسبيرجولوس. c.ذات رئة غير نموذجية. d.ورم قصبي. e.ورم بالمبيضات البيض.	(42)حمى الاستفهام، واحد خطأ: a.العامل الممرض coxilla burnetii b.التهاب شغاف سلبي الزرع c.تنتقل بالحليب المبستر d.قد تتظاهر بذات رئة خلالية e.العلاج النوعي هو تيتراسيكلين	C
B	(45)المبيضات، واحد خطأ: a.ذاتية المصدر b.المبيضات البيضاء أخطر من غير البيضاء c.العلاج النوعي للمبيضات البيض زمرة الأزول d.موجودة في الفلورا بشكل طبيعي e.علاج المبيضات الأمفوتيريسين	(44)مريضة 75 سنة، سكرية تعالج بالحبوب، خضاب السكري 11، تكرر إنتان بولي مع معالجات مختلفة بالصادات، فحص البول: بيض 200 – 300، زرع بول سلبي الجراثيم، احتمال إصابة المريضة، واحد خطأ: a.إنتان بولي باللانموجيا (كلاميديا) . b.زرع سلبي بسبب المعالجة بالصادات c.إنتان بولي بالفطور، غالباً المبيضات. d.سلّي المنشأ. e.إنتان بولي باللايشمانيا	E

B	(47) العلاج النوعي، كريبيتوسبورديوم (خفيات الأبواغ)، واحد صح: a. برازيكوانتيل. b. نيتازوكسايد. c. البيندازول. d. تريكلابيندازول. e. فوريكونازول.	(46) الفطار العفني mucormycosis الجواب الصحيح: a. يحدث بوجود مناعة طبيعية. b. زرع الفطر سهل وسريع النمو. c. يبنى التشخيص على التشريح المرضي للزعات المأخوذة من النسيج المصابة. d. المعالجة بالفلوكونازول. e. يصيب الأطفال والشباب أكثر من المسنين.
E	(49) داء المتورقة Fasciolasis الخطأ: a. تشخص بالفحوص المصلية. b. زيادة الكريات البيض وارتفاع IgG c. يرقان نوبي معاود. d. حرارة نقص وزن حكة. e. المعالجة مترونيدازول.	(48) الملقوات العفجية Ancylostoma الخطأ: a. تستمر الإصابة لعدة سنوات تسيئ للنمو الجسمي والعقلي عند الأطفال. b. فقر دم بعوز الحديد مع فرط حمضات. c. متلازمة شبيهة بلوفلر. d. تترافق بحرارة وهياج واضطرابات سلوكية. e. تعالج بالببندازول.
		(50) في داء الصفر الخراطيني (الخطأ) : a. لا بد لاستمرار الخمج من عدوى جديدة تحدث خلال سنتين. b. يكثر ترافق الخمج مع الخمج بالأنكلوستوما والمسلكات الشعرية الذيل trichuris trichiura c. يبلغ الحمل المتوسط من الديدان 14 – 16 دودة. d. يحدث خمج حيواني المصدر ينجم عن ديدان الصفر الخنزيري التي يصعب تفريقها عن الصفر الخراطيني. e. التشخيص بالاختبارات المصلية.

دورة 2014 تكميلي

تم إلحاق كل سؤال برقم المحاضرة التي تجدون جوابه فيها
تم حذف 17 سؤال مكررة من دورة 2014 نظامية

الدكتور نزار الزاهر

C	17- في CMV واحد خطأ: A. في الخمج الخلقي يمكن كشف الـ CMV في بول الرضع الأصحاء ظاهرياً. B. تتميز الإصابة بوجود مشتملات داخل نوى الخلايا المصابة (عين البومة). C. رغم أن الـ CMV كلية الوجود في بدن الإنسان، لكنها تعيش في حيوانات المخبر. D. الخمج المكتسب غالباً غير عرضي. E. المعالجة بالـ Ganciclovir.	10- في المكورات السحائية واحد خطأ: A. الزمرة B تسبب أعلى نسبة من الإصابات. B. معظم الأشخاص المتماسين مع المصابين يحملون N.M في بلعومهم الأنفي في الحالات البائية. C. أقل معدل لانتشار المرض في الشتاء وأول الربيع وأعلى معدل في الصيف D. المناعة الطبيعية نوعية للنمط وتتطور خلال العقدين الأولين. E. يترافق إنتان الدم بالطفح الحبري في معظم الحالات.	D
C	9- تنتقل العدوى بالإيدز في كل ممايلي عدا: A. من الأم لجنينها B. إبر الحقن الملوثة C. لدغ الحشرات D. عن طريق الاتصال الجنسي E. نقل الدم.	17- في داء المنطقة واحد خطأ: A. تأتي الإصابة بعد الخمج الأولي وتكمن الفيروسات في العقد الشوكية T3,T4 B. تحدث الإصابة عادة لدى الكهول مضعفي المناعة كمرضى الابيضاض وداء هودجكن C. لعودة التفعيل أسباب مختلفة مثل الشدات والتعرض لأشعة الشمس D. نادراً ما تتوضع الإصابة في قطاع عصبي محدد، فهي تصيب كل قطاعات الجذور العصبية. E. يكون محتوى الحويصلات دمويّاً ويكون الألم قبل وأثناء وبعد ظهور الاندفاعات وقد تحدث حرارة عامة خفيفة.	D

B	18- في مجموعات الخطر في النزلة الوافدة واحدة خطأ: A. الأطفال الصغار B. الإناث C. المرضى المسنين D. المصابين بمرض سابق E. المرضى مضعفي المناعة	18- في الفيروسات الأنفية واحد خطأ: A. خروج مفرزات غزيرة ورائحة وصداع وألم حلق. B. السعال فيأتي متأخراً. C. حمى عالية وعرواءات لمرة واحدة D. نسبة طرح الفيروس على أشدها عندما تكون المفرزات رائحة. E. المعالجة عرضية.	C
C	3- في المكورات العنقودية واحد خطأ: A. يصاب الرضع بذات الرئة البدئية. B. المكورات العنقودية الظهارية هي السبب الشائع لالتهاب داخل العين كاختلاط للجراحة العينية. C. معظم الأخماج الهامة بالمكورات العنقودية للنسج العميقة تظهر من التلقيح المباشر للدم (قثاطر، حقن وريدية) D. التهاب الجريبات هو تجمع عدد صغير من الحطاطات الحمائية من دون تورط المحيط أو النسج الأعمق E. الدمل furuncle هو خمج الغدة الجرابية الذي يترافق مع الغزو الجرثومي ومع بعض الصلابة في النسج الجلدية.	3- في المكورات العنقودية واحد خطأ: A. العنقودية سلبية التخثير هي العامل المسبب الرئيسي لأخماج المشافي. B. الرمية هي المسبب الرئيسي لخمج السبيل البولي C. الظهارية هي المسبب الرئيسي لخمج الفلاتر الوعائية وأدوات المداخلات. D. سلبية المخثرة هي المسبب لانحلال الدم أكثر من العنقودية المذهبة E. المذهبة أهم جنس إمرضاً للبشر	D
E	9- في القرص اللين واحد خطأ: A. الحضانة أقصر من الإفرنجي B. العامل الممرض هو هييموفيلسي دوكري C. القرحة أكثر من واحدة D. مؤلمة E. قاعدة القرحة صلبة.	3- في ذات العظم والنقي بالمكورات العنقودية واحد خطأ: A. أكثر شيوعاً عند الأشخاص تحت عمر 20 B. كثيراً ما لا يعين الدخول البدئي C. العديد من المرضى يعطون قصة تلقيهم رضوضاً في المناطق المصابة. D. إذا وصل الخمج إلى الحيز تحت السمحاقى فإن السمحاق يرفع ويتشكل الخراج تحت السمحاقى.	C

E	5- في الكوليرا واحد خطأ A. يؤدي زيادة إفراز الـ CL ونقص امتصاص الـ Na إلى إفراز سائل إسوي التوتر B. يعتبر لقاح الكوليرا ذو فعالية محدودة 3-6 أشهر. C. يلاحظ زيادة الهيماتوكريت وزيادة معتدلة في الكريات البيض. D. تصنف على أساس مستضداتها الجسدية O E. تفرز ضمات الهيضة ذيفان خلوي يؤدي إلى الإسهال.	5- في الإسهالات الناجمة عن الممرضات المعوية المفرزة للذيفان المعوي واحد خطأ: A. لا توجد حمى وقد تكون هناك استجابة التهابية خفيفة B. الإسهال مائي كبير الحجم C. الإسهال تركيزه منخفض من البروتين D. تتوطن الجراثيم المفرزة للذيفان المعوي في الكولونات E. لا بد من ابتلاع كمية كبيرة من الجراثيم مع الطعام أو الماء الملوثن.	D
E	8- في العدوى بالحمى المالطية واحد خطأ A. الحليب ومشتقاته. B. اللحم النيئ. C. التماس مع الحيوانات المصابة أو مخلفاتها. D. ينتقل من شخص لآخر عن طريق نقل نقي العظم ونقل الدم. E. لا تنتقل من الأم خلال الرضاعة.	4- في المطثيات العسيرة واحد خطأ: A. تستوطن الأمعاء الغليظة. B. يحدث عند الكهول والمسنين بعد توسط جراحي C. الإسهال مائي مخاطي مدمى عادة. D. العلاج المفضل فانكوميسين E. تفرز نوعين من الذيفانات المعوية.	C
A	6- في الزحار واحد خطأ: A. في الشكل المعوي الشديد المريض ذو سحنة اسنمامية ومغص مختلف الشدة لكن الحرارة تبقى طبيعية B. الأذيات القرحية في الكولون تكون موضعة غالباً بالمستقيم والأعور C. الإنسان هو الثوي الوحيد D. النواشط تتعدى على الكريات الحمر والطبقة تحت المخاطية E. في تنظير السين لا ينصح بتنظيف الكولون قبل التنظير.	8- في الحمى المالطية واحد خطأ: A. ارتفاع الكريات البيض عن الحدود السوية وعلى حساب اللمفاويات. B. التهاب الشغاف مع تنبئات صمامية أكثر الاختلاطات التي تؤدي للوفاة. C. الذكور أكثر تعرضاً للإصابة بالعدوى من الإناث D. من شهر حزيران حتى شهر أيلول يزداد احتمال العدوى بالبوسيلة أكثر من أشهر السنة الأخرى. E. المفصل الوركاني أكثر المفاصل المحيطة إصابة في الشكل الحاد عند الكهول.	A

E	1- في الأعراض المنذرة ببدء الاستجابة الالتهابية الجهازية في الصدمة الانتانية واحد خطأ A. الحمى B. نقص الحرارة C. تسرع التنفس D. تسرع القلب E. التعرق الليلي.	7- في الحمى التيفية واحد خطأ: A. تشاهد عند مرضى الإيدز أكثر بـ 5 مرات منها عند سوي المناعة. B. النكس قد يحصل خلال 2-3 أسابيع من هبوط الحرارة C. ضخامة كبد وطحال عند غالبية المرضى. D. من أهم الاختلالات النزف والانتقاب والتخثر المنتشر داخل الأوعية. E. بقع رول هي بقع صغيرة حمراء قطرها 2-3 ملم تشاهد على البطن والصدر بشكل رئيسي وتظهر في نهاية الأسبوع الثالث من الإصابة.	A
E	5- في الإسهال الخمجي الحاد واحد خطأ: A. الذيفانات المعوية لا تخرب الخلايا المخاطية. B. الذيفانات الخلوية تسبب إسهال التهابي. C. الذيفانات العصبية تؤثر مباشرة على الجملة العصبية المركزية والمحيطية. D. الذيفانات العصبية يتم إنتاجها من متعضيات خارج المضيف وتسبب أعراض بعد هضمها مباشرة. E. الأطفال الرضع لديهم درجة عالية من الحماية من الإسهالات.	9- في أخماج المتدثرات واحد خطأ: A. لا يعرف مستودع حيواني للمتدثرة الرئوية. B. تنتقل المتدثرة الرئوية من إنسان لآخر بالطريق التنفسي C. من الممكن انتقال الخمج من إنسان لآخر بالتماس. D. في الرئوية تبدي صورة الصدر ارتشاح تحت قطعي متعدد في أغلب الحالات. E. الدواء النوعي هو الدوكسي سيكلين.	D
C	9- في الإنتانات بالكلاميديا واحد خطأ: A. الكلاميديا التراخومية ممرضة للإنسان فقط. B. أهم طرق انتقال المتدثرة الببغائية باستنشاق الغبار الملوث أو التماس C. ذات الرئة المكتسبة بالمجتمع تتميز بحمى فجائية عالية. D. يتميز الطور الثاني بسعال فقط ويغيب ارتفاع الحرارة. E. تبدي صورة الصدر في الإصابة الرئوية ارتشاح تحت قطعي وحيد غالباً.	10- ما هو السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب السحايا المكتسب بالمجتمع بين البالغين؟ A. المستدميات النزلية B. النيسيريات السحائية. C. العقديات الرئوية. D. المكورات العقدية زمرة A E. العنقوديات المذهبة.	C

17- في داء الوحيدات الخمجي واحد خطأ	A. الخمج محدد لذاته. B. ضخامة غدد لمفاوية معممة C. ضخامة طحال D. ارتفاع الكريات البيض E. اختبار الأضداد المتغايرة سلبي	E
12- في التوكسوبلازموز واحد خطأ	a.عدوى الإنسان عن طريق الفم بتناول المشتقات الغذائية الحيوانية النيئة أو غير المطهورة. b.داء المقوسات العيني أغلب الحالات مكتسبة. c.تتسم البيوض المكتسبة المتبوعة بمقاومتها الشديدة d.في الإصابة العصبية المركزية تشاهد كتل في جذع الدماغ والنويات القاعدية. e. داء المقوسات الحولي ينجم عن الخمج الأولي أثناء الحمل	B
10- في أخماج الكليبيسيلا واحد خطأ	A. الانتقال عبر الهواء يعد عاملاً مهماً في نقل الخمج بجراثيم الكليبيسيلا داخل المستشفى. B. ثبت وجودها على الأيدي وفي البلعوم والأنف والأمعاء والعجان لدى الأطباء والمرضات. C. تتميز ذوات الرئة بالكليبيسيلا بميل زائد نحو تشكيل الخراجات والكهوف والتقيحات. D. تسبب ذات رئة فصية تختلف عن ذوات الرئة الجرثومية الأخرى بإحداث تخریب في بقية الرئتين. E. يبدو الفص المصاب بالتصوير الشعاعي منتفخاً مع ظهور علامة الشق المنتفخ.	A
6- رجل أعمال مضطر لتناول الطعام في المطاعم الخارجية، بعد وجبة من سلطات مختلفة، وخضروات غير مطبوخة مع اللحم المشوي، شكى خلال يومين من آلام بطنية، نفخة وغازات، مع براز مخاطي، فحص البراز المباشر بين وجود مبيضات بيض، كريات، نواشط زحارية بكثرة، علاج المريض (واحد صح):	A. فلوكونازول 100 ملغ باليوم B. أمفوتيريسين ب، 50 ملغ باليوم تسريب وريدي C. سالازوبرين + فلاجيل D. مترونيدازول 500 ملغ 3× يومياً E. سيبرو فلوكساسين مع أميكاسين.	D
9- الكلاميديا، واحد خطأ:	A. التهاب عنق رحم مخاطي قيحي عند النساء. B. التهاب إحليل إيجابي الزرع عند الرجال. C. داء حوضي التهابي. D. التهاب كولون ومستقيم عند اللوطيين. E. العلاج ماكروليد	B

الدكتور وحيد رجب بك

C	15- مريضة 75 سنة، سكرية تعالج بالحبوب، خضاب السكري 11، تكرر إنتان بولي مع معالجات مختلفة بالصادات، فحص البول: بيض 200 – 300، زرع بول سلبي الجراثيم، احتمال إصابة المريضة، واحد صح: a. إنتان بولي بالكليبيسيلا. b. زرع سلبي بسبب المعالجة بمضادات الاختلاج. c. إنتان بولي بالفطور، غالباً المبيضات. d. إنتان بالعصيات الزرق. e. التهاب احليل بالمزدوجات البنية.	15- الفطار العفني mucormycosis الجواب الخطأ: A. زرع الفطر صعب وبطيء النمو. B. يبنى التشخيص على التشريح المرضي للخزعات المأخوذة من النسج المصابة. C. لا يحدث بوجود مناعة طبيعية. D. المعالجة بالفلوكونازول. E. يصيب الأطفال والشباب أكثر من المسنين.	E
C	14- حمى الاستفهام واحد خطأ A. العامل الممرض coxilla burnetii B. التهاب شغاف سلبي الزرع C. تنتقل بالطعام المطبوخ D. قد تتظاهر بذات رئة خلالية E. العلاج النوعي هو تيتراسيكلين	16- في داء الصفير الخراطيني واحد صح: A. لاستمرار الخمج لا ضرورة لعدوى جديدة. B. لا يكثر ترافق الخمج مع الخمج بالأنكيلوستوما والمسلكات شعرية الذيل. C. يوضع التشخيص بالاختبارات المصلية. D. فحص البراز المجهرى البسيط غير مشخص. E. يبلغ الحمل الوسطي من الديدان 14-16 دودة.	E
E	13- السفلس مرض مرتبط بالجنس، واحد خطأ: A. العامل الممرض اللولبية الشاحبة. B. التفاعلات المصلية بعد عدة أسابيع من الإصابة. C. يصيب الذكور والإناث. D. قرحة صلبة غير مؤلمة مع ضخامة عقد ناحية. E. لا يستجيب للبينيسيلين.	15- المفطورات Mycoplasma، واحد صح: A. عضويات كبيرة جداً مع جدار خلوي. B. لا تصيب الجهاز البولي والتنفسي. C. ذات رئة لا نموذجية عند الكهول، التهاب قصبات عند الأطفال D. انخفاض LDH E. المعالجة بيتا لاكتام	C

دورة 2013

الدكتور نزار ظاهر

الأسئلة مرتبة وفق ترتيب المحاضرات

A	2- في البروسيلا: A. تسبب افتراق نبضي حروري. B. تنتقل بنقل نقي العظم. C. تنتقل بالحليب ومشتقاته. D. تحدث أذية نسيجية دون تجبن.	1- في الحمى التيفية (الخطأ) : A. تكمن السالمونيلا التيفية بالمرارة بوجود حصيات وتصل بشكل متقطع للأمعاء. B. السبب القريب والمباشر هو الماء الملوث. C. الحملة المزمنون هم فوق 50 سنة وأغلبهم رجال. D. معظم الحالات بسبب الحملة المزمنون. E. تجرثم الدم هو المسؤول عن الحرارة المستمرة.	C
A	4- في التوكسوبلازما (واحد غلط): A. تنخفض نسبة خطورة إصابة الجنين مع قصر المدة الفاصلة بين الخمج و الحمل. B. عدوى الإنسان عن طريق الفم بتناول المشتقات الغذائية الحيوانية أو غير المطهورة جيداً. C. داء المقوسات العيني خلقي غالباً. D. الأذيات الجنينية أكثر خطورة في الثلث الأول مقارنة بالثلث الثالث. E. تتسم البيوض المتكيسة المتبوعة بمقاومتها الشديدة.	3- في التوكسوبلازما (واحد خطأ) : A. يتميز الخمج الجنيني بارتفاع IgG النوعية تلو الولادة. B. يجب توخي الحذر في تفسير الموجودات المصلية لدى المرضى المضعفين مناعياً. C. داء المقوسات الحاد لدى أسوياء المناعة لا يعالج إلا في حالات ذات سير شديد مديد. D. في داء المقوسات الحاد يتم العلاج في الثلث الأول للحمل بالسبيراميسين فموياً. E. بدءاً من شهر الحمل الرابع يمكن العلاج بالبريميتامين مع السلفاديازين.	A
C	6- السفلس مرض مرتبط بالجنس (الخطأ) : A. العامل الممرض اللولبية الشاحبة. B. يصيب الذكور والإناث. C. التفاعلات المصلية إيجابية من تاريخ الإصابة. D. قرحة صلبة غير مؤلمة مع إصابة عقد ناحية. E. يستجيب للبنسلين	5- الكلاميديا (واحد خطأ) : A. التهاب إحليل بني عند الرجال. B. التهاب عنق رحم مخاطي قيحي عند النساء. C. داء حوضي التهابي. D. التهاب كولون ومستقيم عن اللوطيين. E. العلاج ماكروليد.	A

E	8- في الملاريا (واحد خطأ): A. في الملاريا الغب تتراجع شدة النوب مع تقدم سير المرض حتى الشفاء السريري B. التشخيص بفحص لطاخات الدم المحيطي (بعد تلوينها بغيماً) بالمجهر الضوئي. C. العلاج بالكلوروكين للمصورات البيضوية أو النشيطة. D. يعطي الكينين للملاريا المنجلية المعندة على الكلوروكين. E. ارتفاع الكريات البيض على حساب اللمفاويات.	7- في الملاريا (واحد خطأ) : A. الملاريا المدارية أقل معدل إصابة للكريات الحمر من الأنواع الأخرى. B. ينشط البعوض عند الغروب وأثناء الليل. C. ضخامة طحالية متزايدة والكبد ممض وأقل ضخامة. D. بعد الطور الدموي لا تعاود المنجلية P.falciparum الطور خارج الحمر عكس الأنواع الأخرى. E. ترتفع سرعة التثفل بشدة.	A
E	10- في وحيات النوى الخمجي (واحد خطأ) : A. عبر التماس مع لعاب المصاب. B. الخمج لا عرضي عند الأطفال. C. الصورة الدموية تبدي فرط وحيات النوى مع وجود خلايا لمفاوية غير نموذجية. D. ترافق الخمج بمتلازمة بلعمة الكريات الدموية. E. التشخيص استناداً للتظاهرات السريرية وانخفاض الكريات البيض.	9- في داء المنطقة (واحد خطأ) : A. العامل الممرض الفيروس الحلئي من النمط الثالث Varicella B. تكون الفعالية المعدية لاندفاعات داء المنطقة أعلى من الفعالية المعدية لاندفاعات الحماق. C. تتوضع الإصابة في قطاع عصبي محدد. D. الألم مميز قبل وأثناء وبعد ظهور الاندفاعات. E. لا ينصح باستعمال الستيروئيدات ويجب البحث عن خبثة مستبطنة.	B
C	12- في حمى الضنك Dengue Fever (واحد خطأ) : A. يشيع المعتدل في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا الاستوائية. B. البعوض الناقل هو الزاعجة المصرية. C. ارتفاع البيض 2000-3000 لكل ملم مكعب. D. الإصابات عند الأطفال واليافعان الذي تقل أعمارهم عن 15 عام تؤهب للإصابة بحمى الضنك النزفية DHF. E. لا توجد معالجة نوعية، معالجة المعتدلة عرضية.	11- في السعار (الكلب) Rabies (واحد خطأ) : A. الفيروس غير قادر على اختراق جلد سليم. B. خطر انتقال السعار بواسطة الأدوات والمواد الملوثة باللعاب القليل. C. العرض الموجه المذل في مكان الأذية الناجمة عن العض. D. نقص الصفائح والمحبيات مع ارتفاع الهيماتوكريت. E. وجود الأضداد النوعية في السائل الدماغي الشوكي دليلاً تشخيصياً مهماً حتى لو كان الشخص ملقحاً سابقاً.	D

C	14- في الفيروسات الحلئية 2+1 (واحد خطأ) : A. في الخمج بالنمط 2 يصاب الإحليل بكلا الجنسين. B. النكس بالنمط 2 أكثر من النمط 1. C. التهاب الدماغ الحلثي يسببه الخمج بالنمط 2. D. الخيار الأول هو الأسيكولوفير وهو فعال في الخمج المعاود. E. الخمج الموضع جيد الإنذار.	13- في الحمى الصفراء (واحد خطأ) : A. تنتشر الأشكال الشديدة في جنوب شرق آسيا. B. بطء قلب نسبي. C. صداع وآلام ظهرية وعضلية. D. التمنيع الفاعل لمناعة واقية طويلة الأمد. E. لا تشخص سريريا إلا بوجود وباء بسبب تشابه مظاهرها السريرية مع أخماج مدارية عديدة.	A
C	16- في اللستريا واحد غلط: A. ينتقل بالتماس المباشر مع الحيوانات أو الحملة الأصحاء بواسطة الحمامات أو المياه السطحية الملوثة. B. ينتقل بالطريق الفموي بواسطة الحليب الطازج الملوث أو الجبن الطري. C. معند على العلاج بالأمبيسيللين مع الجنتاميسين. D. يجب نفي داء اللستريات لدى الحوامل المصابات بأعراض نزلية مع التهاب حويضة وكلية. E. الشكل العصبي يشاهد عند الصغار والمسنين.	15- رجل عمره 55 سنة يعاني من تعب ووهن عام ونقص وزنه 7 كلف خلال 3 أشهر، لديه ضخامات عقدية لمفية معممة، الإجراء التشخيصي الأنسب: A. صورة صدر بسيطة. B. ايكو بطن وحوض. C. تصوير طبقي محوري. D. خزعة عقد استئصالية. E. FNA.	D
A	18- في فيروس B19 كل ممايلي صحيح عدا: A. يصيب الخلايا اللمفاوية البائية. B. الإصابة بالثلث الأول تسبب إسقاط عفوي. C. تسبب طفح على الوجه يدوم 10 أيام. D. يحدث فيه نوب من عدم التصنع لدى المرضى بفاقات الدّم الانحلالية.	17- في المكورات الرئوية واحد غلط: A. يندر حدوث أوبئة حقيقية من ذات الرئة بالمكورات الرئوية. B. التهاب الأذن الوسطى عند حوالي نصف الرضع والأطفال. C. التهاب الأذن الوسطى الحاد شائعة النكس مع المعالجة. D. التهاب الصفاق أكثر شيوعاً عند الاناث ومعند على المعالجة. E. لقاح المكورات الرئوية يمنع ذات الرئة وتجرثم الدم عند معظم مرضى فقر الدم المنجلي وليس جميعهم.	D

		19-في الباستوريلا (واحد خطأ) : A. من أهم مصادر الخمج الإنساني الحيوانات المنزلية كالقطط والكلاب. B. ينتقل بالتماس المباشر أو المديد مع الحيوانات المصابة. C. الانتقال الهضمي بتناول الأطعمة واللحوم الملوثة. D. لا تحدث التهابات سحايا والانتانات التالية لعضات وأذيات الرأس أعراضاً سريرية مميزة هامة. E. اللقاح فعال في الوقاية من الأخماج.	E
الدكتور وحيد رجب بك			
A	21-العلاج للسرميات (الحرقص) واحد صح: A. ميبندازول. B. تتراسيكلين. C. كينولون. D. امفوتريسين. E. فوريكونازول.	20-العلاج للمتوارقة الكبدية (واحد صح) : A. تريكلابندازول. B. كلاريثرومايسين. C. كاربابينيم. D. اميكاسين. E. سيفالوسبورين.	A
C	23- العلاج النوعي لآنكلوستوما (واحد صح) : A. تتراسيكلين. B. ماكروليد. C. دينزاميدازول. D. فلوكونازول. E. فوريكونازول.	22-العلاج النوعي لـMucormycosis (واحد صح): A. اندوميتاسين. B. كورتيزون. C. امفوتريسين. D. فلوكونازول. E. ميتافرينجين.	C
A	25-العلاج النوعي للكريبيتوكوكس (المستخفيات) واحد صح: A. فلوكونازول. B. البيندازول. C. ميبندازول. D. نيتازوكسانيد. E. برازيكوانتيل.	24-العلاج النوعي للكريبيتوسبوربيديوم (خفيات الابواغ) واحد صح: A. البندازول. B. تريكلابندازول. C. فوريكونازول. D. نيتازوكسانيد. E. برازيكوانتيل.	D

D	27-الرشاشيات (واحد خطأ) : A. تصيب أسوياء المناعة وناقصوها. B. داء الرشاشيات الغازي مرض خطير يؤدي بالحياة. C. علاجه فوريكونازول أو أمفوتريسين. D. ورم الرشاشيات علاجه دوائي. E. يمكن أن تسكن الرشاشيات في كهف درني شافي.	26-العلاج النوعي للشريطية (واحد صحيح) : A. نيكولوزاميد-برازيكوانتيل. B. فلزكنازول. C. امفوتريسين. D. ميكافونيجين. E. اسبرين.	A
		28-المبيضات (واحد خطأ) : A. ذاتية المصدر. B. المبيضات البيضاء أخطر من الغير بيضاء. C. العلاج النوعي للمبيضات البيض زمرة الأزول. D. موجودة في الفلورا بشكل طبيعي. E. علاج المبيضات غير البيض الأمفوتريسين.	B
D	30-المفطورات (واحد خطأ) : A. عضويات ممرضة صغيرة جداً بدون جدار. B. تصيب الجهاز البولي والتنفسي. C. ذات رئة لانموجية عند الكهول أو التهاب قصبات عند الاطفال. D. انخفاض LDH. E. المعالجة الماكروليد.	29-حمى الاستفهام (واحد خطأ) : A. العامل الممرض Coxilla burntii. B. التهاب شغاف سلبي الزرع. C. تنتقل بالحليب المبستر. D. قد تتظاهر بذات رئة خلالية. E. العلاج النوعي هو تتراسيكلين.	C
D	32- داء لايم (واحد خطأ) : A. العامل الممرض Borrelia Burgodferi. B. القراد عامل ناقل. C. حمامى هاجرة مكان اللدغ. D. اربع أطوار سريرية للإصابة. E. المعالجة تتراسيكلين.	31- الحمى الراجعة (واحد خطأ) : A. العامل الممرض البريميات. B. حضانة 5-15 يوم. C. القمل والقراد عامل ناقل. D. حمى شديدة ويرقان وفقر دم. E. العلاج تتراسيكلين.	A

دورة 2012

الدكتور نزار الظاهر

A	2-مريض 18 سنة حرارة و عرواءات ألم بلعوم فجائي شخّص التهاب لوزات حاد قيجي المعالجة المفضلة: A. أموكسيسيلين كلافونيك أسيد. B. سيفالوسبورين جيل ثالث. C. أميكاسين. D. كاربابينيم. E. تايجساكين.	1-أخماج الفطور، الخطأ: A.ازدادت بسبب ازدياد الأخماج الانتهازية ناجمة عن تداخلات طبية. B.العلاجات الكيماوية للخبثات. C.استعمال الكورتيزون. D.الصادات واسعة لطيف و مثبطات المناعة. E.استعمال مواد التعقيم و المطهرات السطحية و المعقمات بكثرة.	E
A	4-سيدة 30 سنة حرارة و سعال قشع ألم بلعوم أسبوعين صورة الصدر كثافة ارتشاحية خلالية في القاعدة اليمنى، مع انصباب جنب خفيف، زرع القشع فلورا طبيعية البيض 5000 ك 70 ل 30 تشغل 70/50 ، CRP : 60، الصح: A.ذات رئة بالعقديات الرئوية. B.سل رئوي. C.ذات رئة قاعدية بالعنقوديات. D.ذات رئة لا نموذجية. E.خراجة رئوية.	3-أجري له فحص براز بعد المعالجة تبين وجود مبيضات بيض، المعالجة: A.أمفوتريسين. B.فلوكونازول. C.فوريكوكونازول. D.ميكافونجين. E.لا حاجة للمعالجة.	E
D	6-رجل 65 سنة سكري يعالج بالحبوب. حرارة منذ شهر دون معرفة السبب مع زكام مستمر عولج لالتهاب الجيوب عدة مرات و بعدة أدوية دون جدوى تصوير طبقي بين وجود غزو لجدار الجيوب و انسدادها بكتلة كبيرة. البيض 5000 ك 60 ل 40، سكر 350 كرياتينين 1.2 تشغل 120 230 = CRP الصح: A.التهاب جيوب مزمن بالعنقوديات المذهبة. B.التهاب جيوب مزمن بالعصيات الزرق. C.ورم على حساب مخاطية الجيوب الفكية. D.فطار عفني. E.ساركوما عظمية.	5-العلاج الأمثل: A.سيفالوسبورين جيل ثالث + ماكروليد أو كينولون. B.أموكسيسيلين كلافونيك أسيد. C.دوكسي ساباتايبين. D.كلورأمفينكول. E.بيبرا سليين تازورباكتام.	B

E	8-بيلة الكريات البيض مع زرع سلبي الخطأ: A. إنتان فطري. B. كلاميديا. C. سل بولي. D. انتان جرثومي معالج معالجة ناقصة. E. التهاب كب و كلية حاد.	7-العلاج الصح: A. فانكوميسين. B. بيبيراسيلين تازوباكتام مع أميكاسين. C. معالجة شعاعية. D. معالجة كيميائية سامة للخلايا. E. امفوتيريسين بوساكونازول.	E?
E	10- في اختلاطات الحماق واحد خطأ: A. إصابة الأم اثناء الولادة بالخمج ترفع نسبة وفيات الولدان B. نسبة الإصابة بالتهاب المخ و المخيخ نادرة. C. ذات رئة حماقية. D. تشوه الجنين لدى إصابة الأم في الثلث الأول من الحمل. E. تخريش سحائي سيء الإنذار.	9-تشاهد علامة فاجيت (افتراق النبض و الحرارة) في كل ممايلي عدا: A. الحمى المالطية. B. داء الببغاء (المتدثرة الببغائية). C. الحمى الصفراء. D. أدواء الليجينولا. E. الحمى التيفية.	A
C	12- في داء فرط الوحيدات الخمجي واحد خطأ: A. العامل المسبب فيروس أبشتاين بار EBV من الفيروسات الحلئية. B. الخلايا الهدف هي الخلايا الظهارية للفم و البلعوم و اللمفاويات البائية. C. إصابة الجنين ذات إنذار سيء. D. يحدث مرض قاتل لدى المصابين بمتلازمة بورتيليو. E. يترافق الخمج بمتلازمة بلعمة الكريات الدموية.	11- في اختلاطات داء المنطقة الخطأ: A. إصابة باطن العين. B. داء المنطقة الأذني: تناذر رمزي هنت إصابة العصب الوجهي و إصابة أذنية. C. داء المنطقة العيني مع خطر إصابة القرنية. D. التهاب سحايا و دماغ. E. داء المنطقة المعمم مع إصابات حشوية ذات رئة و التهاب كب و .	A

D	14- في الحمى المضخمة للخلايا واحد خطأ: A. يشك بانها مولدة للخبثات. B. الخمج داخل الرحم بال CMV من أكثر الأخمج داخل الرحم تواتراً. C. يمكن عزلها من (الحليب، اللعاب، البراز، البول،مني، مفرزات عنق الرحم). D. المعالجة بالأسيكلوفير. E. الصورة الدموية تبدي وجود خلايا لمفاوية غير نموذجية.	13- في فرط الوحيدات الخمجي واحد خطأ: A. الخمج محدد لذاته B. ضخامة عقد لمفاوية معممة. C. ضخامة طحال. D. ارتفاع الكريات البيض. E. اختبار الأضداد المتغيرة سلبي.	E
	16- في لفيروسات الحثية واحد خطأ: A. ساركوما كابوزي يرتبط بالخمج HHV	15- في الحمى المضخمة للخلايا لدى المرضى المضعفين مناعياً واحد خطأ: A. حمى و سير شبيه بداء وحيدات النوى الخمجي. B. التهاب شغاف تحت حاد. C. ذات رئة خلالية. D. نقص كريات بيض و صفائح E. التهاب شبكية.	B
B	18- في إنتان المكورات البنية واحد خطأ: A. السيلان أكثر تواتراً لدى الذكور، رغم أن الانتشار أعلى عند النساء. B. يمكنها البقاء في الوسط الخارجي. C. العدوى من الأم للجنين تحدث أثناء الولادة. D. الخمج لدى الذكور التهاب إحليل حاد وطرح مفرزات قيحية إحليلية.	17- في إنتان المكورات البنية واحد خطأ: A. يساعد الحيض في الوقاية من خطر صعود البنيات الممرضة داخل عنق الرحم. B. توجد النيسيريات في الفلورا الطبيعية للإحليل و المهبل. C. المكورات المرضية ممرضة للبشر فقط. D. يؤدي عوز عوامل المتممة إلى تجرثم الدم بالنيسيريات البنية. E. يزيد من قابلية الإصابة بخمج العوز المناعي المكتسب.	A

B	20- في المتدثرة التراخومية واحد خطأ: A. الخمج العيني بها أحد أهم أسباب العمى. B. العدوى البدئية في سن المراهقة عادةً. C. تسبب المتدثرة التراخومية التهاب الملتحة الاشتمالي الذي يشاهد لدى البالغين الناشطين تناسلياً. D. العدوى بالتلقيح الذاتي بالمفرزات التناسلية المعدية أو بتعرض العين للمفرزات المعدية باتصال فموي تناسلي. E. السبب الأول للالتهاب الإحليل غير البني لدى الرجال.	19- في الإنتان بالكلاميديا واحد خطأ: A. الكلاميديا التراخومية ممرضة للانسان فقط. B. أهم طرق انتقال المتدثرة الببغائية باستنشاق الغبار الملوث أو بالتماس. C. ذات الرئة المكتسبة في المجتمع تتميز بحمى عالية فجائية. D. يتميز الطور الثاني بسعال فقط و يغيب ارتفاع الحرارة. E. تبدي صورة الصدر في الإصابة الرئوية ارتشاح تحت قطعي وحيد غالباً.	C
E	22- تعتبر الأمراض التالية من أهم الأمراض المنتقل بالجنس عدا: A. السيلان البني B. السفلس. C. الإيدز. D. المشعرات المهبلية E. الليجونا.	21- في الورم الحبيبي اللمفي المنقول جنسياً واحد خطأ: A. العامل الممرض هي موفيليس دوكري. B. الآفة وحيدة عديمة الألم. C. الإصابة الجلدية تتميز بشكل حطاطة أو حويصل أو تقرح. D. اعتلال العقد اللمفاوية المنطقي بعد 2-6 أسابيع من الإصابة الأولية مفتاح التشخيص. E. المعالجة دوكسي سيكلين.	A
B	24- في متلازمة العوز المناعي المكتسب واحد خطأ: A. T-cell CD4 تقل بالإصابة بالفيروس. B. يحدد اختبار عيار الأضداد مدى الاستجابة للعلاج. C. يحدد اختبار HIV RNA Viral Load تعداد الجزيئات. D. يساعد اختبار Western Blot في تأكيد التشخيص بالخمج. E. اختبار إيزا سلبي في مرحلة الطور الحاد.	23- في المرحلة الثالثة من متلازمة العوز المناعي المكتسب واحد خطأ: A. إسهال غير مفسر يستمر لأكثر من شهر. B. حمى غير معلة مستمرة أو متقطعة تستمر لأكثر من شهر. C. ذات رئة بالمتكيس الرئوي الكاريني. D. داء مبيضات فموي مستقيمي. E. طولان مشعر.	C

B	26- في العدوى بداء الليستريات واحد خطأ: A. استنشاق الغبار الملوث عند تنظيف الأسطبلات. B. عن طريق الاتصال الجنسي. C. الأطفال من أمهات مصابات. D. التماس المباشر مع الحيوانات. E. الطريق الفموي: حليب طازج ملوث أو جبن طري.	25- في النزلة الوافدة واحد خطأ: A. البدء تدريجي بحمى نمط السلم. B. يجرى التمتع بإعطاء البالغين جرعة اللقاح سنوياً مع بداية الفصول الباردة من السنة. C. صداع و آلام في العضلات و الأعضاء. D. التهاب قصبات ور غامى و حنجرة مع سعال جاف. E. سرعة التثفل و تعداد البيض ضمن الحدود الطبيعية.	A
B	28- في داء الفطر الشعاعي واحد خطأ: A. علاقة بسوء العناية بصحة الأسنان و الرضوض المتكررة. B. الطور المزمن المؤلم مميز للشعيات. C. الانتشار الدموي نادر. D. الأجسام الأجنبية تسهل حدوث الخمج داخل الرحم. E. الجدران الليفية للكتلة صلبة توصف بالمتخشبة تطور مع الزمن نواسير.	27- كل مايلي من طرق العدوى بالبلاستوريا واحد خطأ: A. الجروح الناجمة عن عضات و أذيات الحيوانات. B. التماس المباشر أو التماس المديد مع الحيوانات المصابة. C. الانتقال الهضمي بتناول لحوم أو أطعمة ملوثة. D. نقل الدم و الحقن الملوثة. E. استنشاق القطيرات المخموجة.	D
B	30- في التوكسوبلازما واحد الخطأ: A. عدوى الانسان عن طريق الفم بتناول المشتقات الغذائية الحيوانية النيئة أو غير المطهورة جيداً. B. داء المقوسات العيني أغلب الحالات مكتسبة. C. تتسم البيوض المتكيسة المتبوغ بمقاومتها الشديدة. D. الإصابة العصبية مركزة تتسم بوجود كتل في جذع الدماغ و النويات القاعدية. E. داء المقوسات الحولي ينجم عن الخمج الأولي أثناء الحمل.	29- في الملاريا واحد خطأ: A. بعد الطور الدموي لا تعاود المنجلية الطور خارج الحمر. B. ضخامة كبدية متزايدة الطحال ممضاً و أقل ضخامة. C. الملاريا المدارية أعلى معدل إصابة للكريات الحمر 30%. D. طور بادري لا نوعي: دعث، غثيان، آلام عضلية و عضوية، صداع. E. يوصف الكلوركين البيضوية أو النشيطة أو الوبالية.	B

C	32- في الحمى التيفية واحد خطأ: A. السبب القريب و المباشر الماء و هو الطريق الأكثر شيوعاً أو الطعام الملوث. B. الاستعداد للإصابة مرتفع لدى الولدان و الرضع بسبب نقص الحموضة المعدية لديهم. C. إسهال في الأسبوع الاول لدى البالغين ينقلب إلى إمساك في الأسبوع الثاني. D. ينخفض تكرار المضاعفات بالاستعمال الفوري للصادات المناسبة. E. الحملة المزمنون مصدر العدوى و مصدر حدوث الفاشيات.	31- في الجمرة الخبيثة واحد خطأ: A. العدوى الرئيسية عن طريق الشقوق الجلدية والسحجات و الجروح. B. الآفة الجلدية شديدة السواد جافة خشنة تحيط وزمة متسعة مؤلمة بشدة. C. السير السريري في الجمرة الخبيثة الرئوية صاعق. D. المعالجة بال بنسلين G. E. المداخلات الجراحية مضاد استطباب.	B
B	34- في الحمى المالطية واحد خطأ: A. المرض ينشط في المشيمة و الأغشية و السائل الأمنيوسي و الضروع و الحليب في الحيوانات المصابة. B. لا يقاوم البرودة و يتخرب بالتجمد. C. التهاب شغاف مع تنبؤات صمامية السبب الأول للوفيات. D. التعرق من المظاهر الشائعة و يكون أياماً غزيراً. E. عند الأطفال اخف منها عند البالغين.	33- في الحمى المعوية بالسالمونيلا التيفية واحد خطأ: A. إيجابية زرع البراز في الأسبوع الأول. B. تتميز الحمى المعوية عن التهاب الأمعاء بالسالمونيلا بسيطرة الأعراض الجهازية و انتشار الجراثيم في الدم. C. اختبار فيدال إيجابي. D. الدواء المفضل السيفترياكسون و السيبروفلوكساسين. E. تعداد البيض طبيعي أو تميل للانخفاض.	A
E	36- في أخماج الزائفة الزنجارية واحد خطأ: A. تبدأ مراحل الخمج بمرحلة الانتشار الدموي. B. ذات قصبات و رئة ثنائية الجانب مع ارتشاحات عقيدية. C. التهاب أمعاء يدعى حمى شنغهاي. D. ارتفاع تعدد الكريات البيض مع انزياح أيسر. E. العلاج المفضل بالماكروليدات.	35- في داء البروسيلات واحد خطأ: A. حمى و تعرق ليلي. B. إصابة الجهاز التنفسي غير شائعة عدا السعال الجاف. C. التهاب الخصية و البربخ. D. تعداد البيض طبيعي او يميل للانخفاض. E. إيجابية اختبار 2 مركبتو إيتانول دلالة على إصابة حديثة.	E

C	38- في التهاب السحايا بالمكورات السحائية واحد خطأ: A. الإنسان المستودع الوحيد. B. العدوى تنفسية بالقطيرات الملوثة المحمولة بالهواء. C. العلاج المفضل تتراسيكلين. D. يمكن كشف المكورات في الآفات الحبرية الجلدية. E. اللاتحالية الوظيفية أو استئصال الطحال عامل خطورة للتعرض المتكرر لتجرثم الدم بالمكورات السحائية	37- في الأخماج التالية واحد خطأ: A. العلاج المفضل للموركسيلا هو أموكسيسيلين كلافونات. B. العلاج المفضل للهييموفيلس إنفلونزا سيفالوسبورينات جيل ثالث، سيفترياكسون، سيفوتاكسيم. C. العلاج المفضل لليجونيل هو الأمبيسيلين. D. العلاج المفضل للتولاريميا هو جنتاميسين أو توبراميسين. E. المعالجة عرضية في داء خرمنشة القطعة.	C
E	40- الفيروسات الغدية واحد خطأ: A. مقاومة نوعاً ما لظروف البيئة. B. تعبر السبيل الهضمي دون ان تتخرب. C. الانتقال عبر الهواء بواسطة القطيرات. D. تسبب كل من التهاب الطرق التنفسية الحاد و الحمى الملتحمية البلعومية. E. المعالجة بالأسيكلوفير.	39- في التهاب الأنف الفيروسي الحاد واحد خطأ: A. ذورة الحدوث بفصلي الخريف و الشتاء. B. عدد الانماط المصلية كبير. C. الحمات الأنفية شديدة العدوى تنتقل عبر القطيرات الملوثة من انسان لآخر. D. يوجد تصالب مناعي بين الأنماط المصلية. E. المعالجة عرضية.	D
E	42- في السعار داء الكلب Rabies واحد خطأ: A. أعلى مسبب وفيات في الأمراض الخمجية B. الشكل المدني الحضري ينجم عن عضات الكلاب المنزلية و القطط. C. خطر انتقال السعار بواسطة الادوات الملوثة باللعب قليل. D. العرض الموجه للسعار هو المذل في مكان الأذية الناجمة عن العض. E. لعاب الحيوان المخموج خلال العض يصبح معدياً بعد أسبوع من ظهور الأعراض السريرية للمرض.	41- في الخمج بالفيروس B19 واحد خطأ: A. الخلايا الهدف للفيروس هي سلسلة الخلايا المكونة للحمرة في النقي. B. ينتقل الفيروس بالطريق الهضمي بشكل رئيسي. C. ارتفاع في نسبة الحمضات و تصل نسبتها حتى 25%. D. من مظاهره الهامة طفح بقعي حطاطي يبدأ في الوجه قد يشبه طفح الفراشة. E. ينتقل من الأم المصابة للجنين.	B

	43- حمى الضنك deng واحد خطأ: A. ارتفاع في تعداد الكريات البيضاء. B. البعوض الناقل هو الزاعجة المصرية التي تعدّ مستودعاً. C. البدء بالشكل التقليدي حمى مفاجئة صداع شديد آلام خلف المقلة تزداد بالحركة. D. المظهر الجلدي المميز طفح جلدي بقعي سريع الزوال يشبه طفح الحمى القرمزية أو الحصبة. E. آلام مفصليّة و عضليّة حادة.	A
--	--	---

دورة 2010 النظامية

الأسئلة مرقمة حسب ترقيم المحاضرات

د. نزار الزاهر

D خطأ، تنذر.	5- الاشرشيا الكولونية السامة المعوية: A. ذروة الحدوث بالفصول الرطبة الدافئة. B. تنتشر بالطريق الفموي البرازي. C. هي سبب مهم لإسهال المسافرين. D. تكثر العدوى من شخص لأخر. E. يعد ماء الشرب غير المعالج والخضار والفواكه المغسولة بماء ملوث وغير المطبوخة وسطاً ناقلاً للعدوى.	8- كل ما يلي صحيح في داء البروسيلات: A. المجهضة هي الأشيع. B. المجهضة تصيب الماعز والأغنام. C. يزيد تناول مضادات الحموضة من خطورة الإصابة. D. المستودع الرئيسي هو الماشية.	B خطأ، الأبقار
D، تحتاج الغشاء المخاطي وتخربه ولكن لا تصل لتحت المخاطية.	6- الشيغلا (الخطأ): A. الثوي الوحيد هو الإنسان. B. مقاومة للحمض. C. تنتشر في أماكن الرعاية والسباحة والأماكن المختلطة وتنتقل بالملامسة. D. تغزو جدار الأمعاء وتصل لتحت المخاطية.	8- كل ما يلي في المظاهر السريرية لداء البروسيلات عدا: A. آلام مفصليّة في الأطراف. B. حمى متموجة. C. تكثر إصابة المفصل الحرقفي الفخذي والعمود القطني. D. تنذر إصابة المفصل الحرقفي العجزي عند الأطفال. E. أكثر الصمامات إصابة بالحمى المالطية هو مثلث الشرف.	E خطأ، الأبهري هو الأكثر وأقلها التاجي

A خطأ باستثناء التيفية فالثوي الوحيد لها هو الانسان	7- السالمونيلا: A.الثوي الوحيد هو الإنسان. B.تجتاح اللغائفي القاصي وتتوضع في لويحات باير. C.تتحرر جراثيم السالمونيلا ذيفاناً هضمياً يشبه الذيفان العطوب بالحرارة الذي تفرزه الاشريشيا كولي السامة معوياً. D.تنجم العدوى عن تناول أغذية ومشتقات لبنية ولحوم ودجاجا ملوث .	6-أخماج العطائف: A.ذات سير حاد أو مزمن تصيب الإنسان والحيوان. B.تزداد الإصابات في أشهر الصيف الحارة. C.تعد الخنازير المستودع الأكبر للعطائف الكولونية وكذلك الأبقار والأغنام. D.يعد الإنذار سيئاً. E.ذات انتشار عالمي واسع	D خطأ لم تعط هذا العام.
E خطأ، إنما الانتان الشديد.	6-في داء اليرسينيات (الخطأ): A.تحدث الأخماج البشرية باليرسينيات طوال العام، مع ذروة حدوث في أواخر الخريف وأواخر الشتاء. B.يعد التهاب الامعاء والتهاب الامعاء والكولون أشيع المظاهر السريرية لخمج اليرسينية الملتهبة للأمعاء والكولون. C.التهاب العقد للمفاوية المساريقية شائع في خمج اليرسينية السلية الكاذبة. D.تحدث التهاب مفصلي انتاني. E.من مظاهر السلية الكاذبة التهاب ملتحة أوتشمع كبد.	1-في الصدمة الانتانية: A.تجرثم الدم هو وجود جراثيم بالدم دون وجود أعراض جهازية أو مظاهر إنتانية. B.إنتان الدم هو وجود الاستجابة الالتهابية الجهازية تجاه العامل الممرض مع انتشار العامل الممرض والذيفانات بواسطة السبيل الدموي. C.الصدمة الانتانية هي ترافق الانتان مع فشل أجهزة وأعضاء متعددة مع هبوط ضغط لا يستجيب على السوائل. D.متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية تحدث بسبب غير انتاني. E.متلازمة الاستجابة الانتانية تترافق مع قصور عضو أو أعضاء متعددة.	D خطأ حماض استقلابي
C	2-يحدث في الصدمة الإنتانية: A.نقص شديد في المقاومة الجهازية. B.الحصيل القلبي طبيعي منذ البدء وربما يرتفع. C.قلاء تنفسي. D.قلاء استقلابي.	1-في الصدمة الانتانية(الخطأ): A.الاشارات الجرثومية في الجراثيم السلبية الغرام هي الذيفان الداخلي. B.الاشارات الجرثومية للجراثيم ايجابية الغرام هي الغليكوببتيد والذيفانات وبعض عديدات السكر. C.كثير من الحالات لا نجد موقعاً أولياً ظاهراً للخمج.	

B خطأ، نقص ألبومين المصل.	2-في الصدمة الإنتانية الموجودات المخبرية مع تطور الاستجابة الإنتانية: A.تطاؤل.PT B.ارتفاع الألبومين في المصل. C.يرتفع البيلوروبين D.ينقص الفيبرونوجين.	2-في الصدمة الإنتانية غياب الحمى هي الظاهرة الأكثر شيوعاً لدى: A.حديثي الولادة. B.المرضى المسنين. C.الكحوليين. D.المصابين بالقصور الكلوي . E.السكريين.	E خطأ.
D	15-يشخص داء الرشاشيات الرئوي الغازي ب: A.أخذ عينات قشع وفحصها وتلوينها بتلوين غرام. B.إيجابية زرع عينات القشع. C.تحري وجود الأضداد والمستضدات. D.اكتشاف غزو الرشاشيات للنسيج في مقاطع التشريح المرضي.	15-الأفلاتوكسين: A.ذيفان يسبب أذية سمية حادة وهو ذو تأثير مشوه ومولد للخباثات. B.يوجد في انواع الفستق ولا سيما فستق العبيد واللوز ومنتجاتهما والحبوب. C.هو مضاد حيوي تفرزه فطور السيفالوسبوريم.	C خطأ.
D	16-كل ما يلي يسبب أذية رئوية مع التهاب عدا: A.الصفير الخراطيني. B.الملقوات. C.الاسطوانيات البرازية D.السرمية الدودية.	16-في داء الملقوات: A.لا تتكاثر الديدان لدى المضيف. B.قد تسبب فقر دم بعوز الحديد. C.تحدث العدوى الحادة التهاب رئوي.	كلها صحيحة
A صح	16-ما هو المرض الذي ينتقل عبر حليب الأم (الارضاع) مما يلي: A.الاسطوانيات البرازية. B.الصفير الخراطيني. C.المشوكات D.السرمية الدودية.	16-داء المشوكات: A.يصاب الانسان بالعدوى بعد تناول البيوض. B.تشخص بال CT والمرنان. C.تشخص بالخرزة D.قد توجد الكيسات بمعظم الأعضاء.	Cالخرزة مضاد استطباب.

D خطأ	13-في السفلس: A.تبقى الاختبارات اللولبية ايجابية مدى الحياة بعد الخمج البدئي سواء طبقت معالجة ناجحة أم لم تنطبق. B.الاختبارات اللولبية لا تعكس فعالية المرض بعد الإصابة به فقط. C.تعطي عيارات الاختبارات اللولبية فعالية المرض وتخفص بعد المعالجة الملائمة. D.لا تعكس عيارات الاختبارات اللولبية فعالية المرض ولا تنخفص بعد تطبيق المعالجة الملائمة.	13-في السفلس يكون القرص: A.وحيد صلب غير مؤلم مع اعتلال عقد لمفاوية ناحي ممض. B.وحيد صلب غير مؤلم مع اعتلال عقد لمفاوية ناحي غير ممض. C.متعدد صلب غير مؤلم مع اعتلال عقد لمفاوية غير ممض. D.لين وحيد غير مؤلم مع اعتلال عقد لمفاوية ناحية ممض.	B صح
D خطأ	15-في حمى الاستفهام: A.تحدث أغلب الاصابات البشرية باستنشاق العامل الممرض. B.تعد الكوكسيلاات عالمية الانتشار وهي ذات طيف أثوياء واسع. C.قد يحدث الخمج والانقلاب المصلي بتناول الحليب غير المبستر ومشتقاته. D.تنتقل بتناول لحم الغزلان غير المطبوخ. E.تتظاهر حمى الاستفهام الحادة بأعراض عامة تشبه اعراض النزلة الوافدة .	13-في داء البريميات (الخطأ): A.أهم مستودعاتها القوارض والحيوانات الأهلية. B.ينتقل الخمج للإنسان عبر السحجات والجروح الجلدية. C.ينتقل الخمج للإنسان عبر عضات الفئران والجرذان واليرابيع. D.ينتقل الخمج للإنسان عبر أذيات الغشاء المخاطي للفم والانف والملتحمين. E.يبدأ المرض بوجود طور باردي بحمي وعرواءات وصداع وآلام عضلية.	E خطأ يبدأ فجأة دون أعراض بادرية.
C خطأ.	10-في أخماج المكورات السحائية (الخطأ): A.تنتقل عدوى المكورات السحائية بالقطيرات الملوثة المحمولة بالهواء وبالتماس مع المفرزات التنفسية للمصابين. B.ليس للانتقال بالأدوات أهمية تذكر. C.العلامات العصبية قليلة التوارد. D.يعد التهاب السحايا أهم أخماج النيسريات السحائية.	شباب عمره 22 موظف بعمل اداري جاء بشكوى صدرية مع شحوب وبقان وبالاستقصاءات تبين وجود ذات رئة لا نموذجية ، تعالج هذا المريض ب: A.سفترياكسون وريدياً مع مايكروليد. B.أموكسيسيلين. C.ايميدزول فموي . D.بنسلين عضلي	A

D خطأ	10-في الزاوائف الزنجارية: A.من العوامل المؤهبة استعمال بعض العناصر الصناعية مثل القناطر الوريدية والبولية والمفجرات. B.يتظاهر الخمج في الحالات النموذجية بذات قصبات ورثة ثنائية الجانب. C.يعد انصباب الجنب شائع اما الدبيلة الجنبية فنادرة. D.الاصابة غير شائعة لدى المصابين بالداء الليفي الكيسي لأنها لا تميل للتوضع في القصبات المتوسعة.	10-في الكليسيلا: A.تحدث الكليسيلا أخماج لدى المسنين والكهول ولمضعفين. B.تحتل المركز الثاني في أخماج سلبيات الغرام المشفوية بعد E.C C.أكثر ما تسببه أخماج في السيلين التنفسي والبولي. D.الانتقال عبرالهواء يعد عاملاً مهماً في نقل الخمج داخل المشفى.	D خطأ.
كلها صحيحة	11-في اخماج المستدميات النزلية: A.تتركز الإصابة بها بالعمر بين السنة والخمس سنوات. B.يعد الخمج نادراً بعد تجاوز السادسة من العمر إلا لدى المضعفين مناعياً. C.تشمل مجموعة المؤهين لخطر الخمج نقص الغاما غلوبين بالدم الخلقي أوالمكتسب.	11-في أخماج الموروكسيلا النزلية: A.الانتقال يكون بالتماس المباشر أو من خلال القطيرات الملوثة المنقولة بالهواء. B.تبدوالاستجابة البشرية لخمج الموروكسيلا النزلية غير مرتبطة بالعمر. C.من التظاهرات السريرية الأذن الوسطى الحاد عند الاطفال والتهاب الجيوب والأخماج المشفوية. D.يترافق خمج السبيل التنفسي السفلي عند الأطفال بقصة وجود خمج رئوي راهن بالفيروس المخلوي التنفسي. E.لا يوجد لقاح.	B
D خطأ دائماً	18-في اخماج الفيروسات الغدية: A.تبقى قادرة على التكاثر لمدة عشرة أيام في المحيط. B.تنتقل العدوى باستنشاق القطيرات الملوثة المنقولة بالهواء. C.تستطيع ان تستخدم العضويات المختلفة كغذاء لها. D.تكون المناعة مؤقتة للنمط المصلي الذي أدى للإصابة فقط.	11-في داء الفيلقيات: A.يكثر وجود الفيلقيات في المستودعات المائية الصناعية. B.تنتقل من شخص لآخر. C.تنتقل العدوى إما استنشاق ماء ملوث بها أوخمج قطيرات منقول بالهواء. D.التظاهرة الأهم هي ذات الرئة.	B خطأ

B خطأ.	3- في أخماج المكورات العنقودية: A. بعض أصناف العنقوديات جزء من النبت الطبيعي للجلد والأغشية المخاطية عند الانسان. B. بعضها يفرز ذيفان معوي عطوب بالحرارة يسبب انسمام مائي. C. توجد في الهواء. D. توجد في الماء. E. توجد في التراب	9- في أخماج المكورات البنية: A. توجد في الفلورا الطبيعية للإحليل والمهبل. B. ممرضة للبشر فقط. C. يعد الانسان المضيف الطبيعي الوحيد. D. أكثر عند الذكور.	D خطأ
C غلط للعنقوديات	34- كل ما يلي من التظاهرات السريرية للعقديات مجموعات A عدا: A. متلازمة الصدمة السمية بالعقديات. B. الحمى القرمزية. C. متلازمة الجلد المسموط. D. من العقابيل الحمى الرثوية. E. من العقابيل التهاب كبيبات الكلى الحاد.	3- في الجمرة: A. تتوضع في الجلد المرن للقسم العلوي للصدر. B. هي آفة قاسية مؤلمة واسعة. C. تترافق بالحمى. D. تترافق بالألم المبرح والإعياء. E. يكثر اختلاطها بتجرثم الدم.	A
D	36- العوامل المؤهبة للخمج بالعقديات الرئوية الغازية كل ما يلي عدا: A. استئصال الطحال. B. فقر الدم المنجلي. C. الورم النقوي العديد. D. الحمل. E. الالبيضااض اللمفاوي.	11- في أخماج المكورات الرئوية: A. ينتقل بالقطيرات المحمولة بالهواء. B. يمكن أن يحدث الخمج دون التصاق العقديات بخلايا ظهارة البلعوم. C. أهم اسباب التهاب الأذن الوسطى الحاد والتهاب الجيوب الحاد. D. يتظاهر الخمج الحاد الغازي بتجرثم دم بدئي في الأطفال. E. يوجد لقاح عديد التكافؤ مشتق من عديد السكريد المحفوظة للأنماط ال 23 الأشيع.	B خطأ فهي الخطوة الأولى للخمج

E	37-داء الليستريات: A.خمج منقول بالطعام. B.ينتقل بالتماس المباشر مع الحيوانات المخلوطة. C.قد ينتقل في الحمامات أوالمياه السطحية الراكدة. D.ينتقل بالطريق الفموي عبر تناول الحليب الطازج الملوث أوالجبن.	B
D خطأ غير مؤلمة	12-في الجمرة الخبيثة: A.مرض خمجي حاد يصيب الثدييات آكلات العشب عادة. B.يمكن لأبواغ الجمرة الخبيثة أن تبقى حية في التربة لعشرات السنين. C.تشكل الشقوق الجلدية والسحجات والجروح أهم بوابات الدخول. D.تكون الجمرات مؤلمة. E.في الجمرة الخبيثة يكون البدء صاعقاً.	4-كل ما يلي من التظاهرات السريرية للتسمم الوشقيقي عدا: A.قد يؤدي تناول كميات قليلة من طعام ملوث إلى أعراض شديدة. B.كلما كانت فترة الحضانة أطول ازدادت شدة المرض. C.غثيان وإقياء. D.ثبات الحدقتين واتساعهما. E.ازدواج الرؤية أوتغيمها وجفاف الفم واللسان.
B خطأ غير شائع	4-كل ما يلي صحيح في أنماط الكزاز عدا: A.يعد الكزاز الوليدي سبباً رئيسياً لوفيات الولدان في البلدان المختلفة. B.الكزاز الرأسي شائع ويلى إصابات الرأس والتهابات الأذن الوسطى عادة. C يتظاهر الكزاز الموضع باستمرار الصمل في مجموعة عضلية وثيقة الصلة بمكان الإصابة. D.لا ترتفع الحرارة عادة. E.في الكزاز الموضع نسبة الوفيات منخفضة .	

الدكتور وحيد رجب بك

b	16-الصر الخراطيني أسكاريس الخطأ: A.تترافق مع خمج بالأنكليوستوما و شعرية الذيل. B.تتكاثر الديدان في المضيف. C.تحدث التهاب بنكرياس و طرق صفراوية. D.متلازمة لوفلر. E.تعالج بالألبندزول.	16-الملقوات العفجية الخطأ: A.تستمر الإصابة لعدة سنوات، تسيء للنمو الجسمي والعقلي عند الأطفال. B.فقر دم بعوز الحديد مع فرط حمضات. C.متلازمة شبيهة بلوفلر . D.تترافق بحرارة وهياج واضطرابات سلوكية. E.تعالج بالألبندازول	D
---	--	---	---

A	16-داء المشوكات الكيسي، الص: A.تشخص بالتصوير الطبقي المحوري. B.علاج الكيسات المتعددة جراحي. C.علاج الكيسة الوحيدة ألبيندازول برازيكوانتيل. D.يمكن بزل الكيسة أو الكيسات للتشخيص أو المعالجة بالحقن. E.تنتقل العدوى عن طريق جهاز التنفس بالرداذ.	16-داء السرميات Entorobiasis الخطأ: A.حكة فرجية وشرجية B.ازدياد الحمضات في الدم C.مبيندازول. D.يعالج كافة أفراد العائلة في نفس المنزل حتى غير العرضيين. E.تحدث عدوى ذاتية بالبيوض تتلوث بها الأصابع بسبب الحكة الشرجية.	b
B	16-داء المتورقة: Fasciolasis A.تشخص بالفحوص المصلية B.زيادة الكريات البيض وارتفاع IgG. C.يرقان نوبي معاود D.حرارة نقص وزن حكة E.ألبيندازول.	16-داء الكيسات المذبذبة Cystosecrosis الخطأ: A.العامل الممرض الدودة الشريطية B.العدوى ذاتية. C.تتوضع في النسيج العصبي و العين. D.العلاج الرئيسي ألبيندازول برازيكوانتيل مع كورتيزون. E.العلاج الجراحي مستطب.	E
	13-عاملة خدمة فلبينية استقدمت للعمل في سوريا التفاعلات المصلية VDRL إيجابي TPHA سلبي، الخطأ: A.العاملة مصابة بالسفلس يجب إعادتها لبلدها. B.العاملة مصابة سابقاً و لديها تفاعلات إيجابية يمكنها العمل و لا تعاد لبلدها. C.لا حاجة للمعالجة في هذه الحالة. D.المريضة غير معدية بالتماس الدموي. E.المريضة غير معدية باللغاب والمفرزات القصبية و المهبلية.		A

انتهت أسئلة الدورات ^ _ ^

.. كل التوفيق نتمناه لكم ..

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرْفٍ مُرُومٍ
فَلَا تَقْنَعُ بِمَا دُونَ النُّجُومِ
فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ
كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ عَظِيمٍ
يَرَى الْجَبْنَاءُ أَنَّ الْعَجْزَ عَقْلٌ
وَتِلْكَ خَدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيمِ
وَكُلُّ شَجَاعَةٍ فِي الْمَرْءِ تُغْنِي
وَلَا مِثْلَ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَكِيمِ
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا
وَأَفْتَهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ
وَلَكِنْ تَأْخُذُ الْأَذَانُ مِنْهُ
عَلَى قَدَرِ الْقَرَائِحِ وَالْعُلُومِ



هذا وما كان من توفيق فمن الله ،،
وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان ،،
فمنّا ومن الشيطان ..

#RBCs_Infectology

#VIVA_RBCS

