

الدكتور عبد الحميد الملقى

فيزيولوجيا التنفس ٢



تنظيم التنفس

- الهدف : استتباب التبادل الغازي و ملائمة المتطلبات الاستقلابية و الحاجة لل O_2 و طرح الفائض من CO_2 آليات التنظيم:

- مراكز عصبية في الجسر و البصلة
- مستقبلات كيميائية مركزية و محيطية

تنظيم التنفس

المراكز العصبية : ثنائية الجانب

- المجموعة الظهرية في البصلة (مركز الشهيق) : **ناظم التنفس**، ممتدة بشكل واسع في البصلة ضمن نواة السبيل المفرد التي تتلقى تنبيهات حسية من المبهم و البلعومي اللساني. يرسل سيالات منبهة ذاتية متعاضمة إلى الحجاب الحاجز عبر العصب الحجابي ← الشهيق، ثم تتوقف ← الزفير

- المجموعة البطنية في البصلة (مركز الزفير العميق): تبقى غير فعالة في التنفس الاعتيادي الهادئ، و تملك عصبونات تثير الشهيق و أخرى للزفير: ينبه العضلات المستقيمة البطنية أثناء التنفس القسري فقط

تنظيم التنفس

- المركز المثير للتنفس pneumotaxic center في المنطقة العلوية الظهرية من الجسر و ينظم عمق و معدل التنفس:
يرسل سيالات دائمة إلى المجموعة الظهرية لتنظم إيقاع تنبيهاتها. التنبيه القوي من هذا المركز يثبط عمق الشهيق و ينقص امتلاء الرئة فيزيد تواتر الشهيق و الدورة التنفسية و التنبيه الضعيف يعاكسه
- المركز الناهي Apneustic centre المعاكس للمركز السابق و يقع أسفل الجسر، وظيفته غير معروفة بدقة، يزيد عمق الشهيق و امتلاء الرئة


تنظيم التنفس

• يعتمد عمل المراكز العصبية على:

- مستقبلات مركزية حساسة بشكل أساسي لـ H^+

- مستقبلات محيطية: المستقبلات الكيميائية، مستقبلات التمدد والتخريش والمستقبلات العضلية

- أوامر من قشر الدماغ والوطاء



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

تنظيم التنفس


- المستقبلات المركزية الكيميائية :

تتأثر العصبونات المركزية بشكل كبير بمستوى H^+ (PH)، لكنها لا تعبر الحاجز الدماغي بسهولة

بينما يعبر CO_2 الحاجز الدماغي فيؤثر بشكل مباشر على العصبونات و بشكل غير مباشر

بشكل فعال جدا عبر تشكيل H_2CO_3 لذلك يعد

الناظم الأساسي لعمل العصبونات



تنظيم التنفس

- المستقبلات المحيطية الكيميائية:

موجودة في الجيب السباتي و قوس الأبهر

حساسة بشكل كبير ل PO_2 لاسيما إذا أصبح > 60 ممز


حساسة أيضا ل PCO_2 و PH لكن حساسية المستقبلات المركزية < 7 مرات

تنبيه المستقبلات المحيطية أسرع، نقل عصبي عبر
المبهم و اللساني البلعومي (استجابة سريعة للجهد)

- $PO_2 \downarrow \rightarrow$ تنبيه التنفس

- $PCO_2 \downarrow \rightarrow$ تثبيط التنفس

- $PH \uparrow \rightarrow$ تثبيط التنفس



تنظيم التنفس

- مستقبلات التمدط stretch المحيطية:

- منعكس رئوي: تمدد الأسناخ ← الزفير

- انخماص الأسناخ ← الشهيق

- (منعكس هيرنغ-بروير Hering-Breuer inflation reflex): تتمدط الطرق

- الهوائية ينبه مستقبلات التمدط ← تنبيهات عبر المبهم إلى المجموعة الظهرية يوقف الشهيق (يثبط التنفس العميق) منعاً من تمزق الرئة و ↑ معدل التنفس (مماثل للمركز المثير)

- منعكس من جدار الصدر: تمدده ← ينبه الشهيق

- سيالات عصبية إرادية تأتي من قشر الدماغ تثير أو تثبط مراكز التنفس فتتحكم بمعدل التنفس و شكله حسب الحاجة و لكن لمدة محدودة (أثناء الرياضة و الغناء....)

التنفس في المرتفعات

- $PO_2 < 300$ ممز ← تنبيه المستقبلات المحيطية ← تنبيه مركز التنفس ← معدل التنفس ← PCO_2 ↓ و PH ↑ ← تثبيط التنفس ← O_2 ↓ (صداع و غثيان)
- بعد ساعات يتأقلم المركز العصبي مع PCO_2 ↓ فيتحسن التنفس و O_2 ↑ ثم تفرز الكلية الأريتروبيوتين ← الكريات الحمر

التنفس في المنخفضات

- أثناء الغطس (بسبب $\uparrow$ الضغط تحت سطح الماء) تنتشر كميات كبيرة من الأذوت الهوائي إلى الدم و تنحل في المصورة، و عند العودة إلى سطح الماء بسرعة تشكل فقاعات غازية ← صمات هوائية

- قصور التنفس هو عدم قدرة جهاز التنفس على القيام بتأمين تبادل غازي سوي بين الوسط الخارجي و الأسناخ ثم بين الأسناخ و الدم لتأمين O_2 و طرح CO_2
- قصور التنفس ← نقص أكسجة النسيج و تعتمد الأذية الناتجة على:
 - درجة نقص الأكسجة و مدته
 - استقلاب النسيج
- أكثر النسيج تأثرا: القلب و الدماغ

نقص الأكسجة النسيجية

- عدم وصول الأكسجين بشكل كاف إلى النسيج أو عدم قدرة النسيج على الاستفادة منه
- أسبابه:
 - ما قبل الرئة: O_2 الهواء، نقص تهوية عصبية أو عضلية المنشأ
 - رئوي: $\downarrow$ نفوذية الغشاء التنفسي، عدم التوافق بين التهوية و التروية، نقص تهوية رئوي المنشأ بسبب $\uparrow$ مقاومة الطرق الهوائية، آفات المتن الرئوي (التليف و النفاخ)، الريح الصدرية
 - دوراني: التحويلة من اليمين إلى اليسار، نواسير شريانية وريدية، قصور دوراني
 - دموي: فقر دم أو شذوذات الخضاب، الانسمام ب CO
 - نسيجي: اضطرابات الإنظيمات التنفسية، عوامل سمية

نقص الأكسجة النسيجية

- في جميع الحالات ينقص P_aO_2 ، أما P_aCO_2 فلا يرتفع إلا في نقص التهوية لأن انتشار $O_2 < CO_2$ ب ٢٠ مرة و $\downarrow PCO_2$ يحرض مراكز التنفس
- يفيد O_2 الصرف في الأسباب غير النسيجية
- يحدث الزراق في نقص الأكسجة عند وجود كميات كبيرة من الخضاب منزوع الأكسجين (< 5 غ / ١٠٠ مل) في شعيرات الجلد و الأغشية المخاطية بسبب فرط استخلاص النسيج للأكسجين

نقص التأكسج بأسباب قبل رئوية

- P_aO_2 و P_vO_2 ↓
- نقص الأكسجين المستنشق: كما في الارتفاعات أو الحرائق
الانسمام ب CO: ألفة الخضاب ل CO < ألفته ل O_2 ب
٢١٠ ← عدم ارتباط الخضاب ب O_2 على مستوى الرئة
وعدم تركه على مستوى النسج و تشكيل كاربوكسي
هيموغلوبيين بطيء التخرب، يعالج بمزيج من الأكسجين
بضغط عال مع ٥ % CO_2 لتنبيه مراكز التنفس
- أثناء الراحة تكون الأعراض خفيفة إذ يستطيع التبادل الغازي
تأمين O_2 و طرح CO_2 و لكن يظهر القصور أثناء الجهد ←
 PO_2 ↓

نقص التأكسج رئوي المنشأ

- في نقص التهوية تنقص كمية الهواء الداخل إلى الأسناخ
 - $PO_2 \downarrow$ و $PCO_2 \uparrow$ بشكل متعادل
 - PO_2 الأسناخ = PO_2 الشرياني
- أما في أذية الغشاء التنفسي يكون الفارق بين PO_2 الأسناخ و PO_2 الشرياني كبيراً

عدم التوافق بين التهوية و التروية

- أهم أسباب نقص PO_2 الشرياني، و يحدث عند وجود أسناخ مهواة دون تروية مناسبة أو شعيرات دموية تروي أسناخا ناقصة التهوية
- نسبة التهوية/التروية V_a/Q :
 - $V_a/Q \downarrow \leftarrow$ قسم من الدم لا يتأكسج (تحويلة فيزيولوجية)، كما في قاعدة الرئة
 - $V_a/Q \uparrow \leftarrow$ قسم من الهواء لا يتبادل مع الدم (الحيز الميت الفيزيولوجي)، كما في قمة الرئة
- PCO_2 يرتفع في البداية ثم يصبح سويا

نقص التأكسج دوراني المنشأ

- الصدمة الدورانية
- الركودة الدموية المعممة أو الموضعية
- التحويلة من اليمين إلى اليسار: مرور الدم من القلب الأيمن إلى الأيسر دون أن يتأكسج
- مرضيا: ناسور شرياني وريدي رئوي
- بقاء القناة الشريانية الوريدية مفتوحة
- P_aO_2 و محتوى الدم من O_2 طبيعي بينما ينخفض P_vO_2 بشدة

نقص التأكسج دموي المنشأ

- فقر الدم: P_aO_2 ونسبة إشباع الخضاب ب O_2 طبيعية لكن محتوى الدم من O_2 قليل $\leftarrow P_vO_2 \downarrow$
- أكسدة حديد الخضاب من قبل بعض الأدوية و السموم و تشكل المتهيموغلوبيين غير القادر على نقل O_2

نقص التأكسج نسيجي المنشأ

- عدم قدرة النسيج على استخدام الأكسجين بسبب تثبيط الجهاز الإنزيمي المسؤول (السيتوكروم)
- الأسباب:
 - التسمم بالسيانيد:
 - الكحول و المخدرات:
- P_aO_2 و محتوى الدم من O_2 طبيعي لكن عدم استخدام النسيج للأكسجين $\leftarrow P_vO_2 \uparrow$

فرط الكربمية

- تعني $\uparrow \text{PCO}_2$ الدم
- يحدث فقط عند وجود نقص تهوية سنخية أو قصور دوراني، إذ إن سرعة انتشار $\text{O}_2 < \text{CO}_2$ بـ ٢٠ مرة، و $\uparrow \text{PCO}_2$ يحرّض مراكز التنفس
- أسبابه:
 - الآفات الرئوية المعيقة للتهوية
 - اضطرابات حركية القفص الصدري: اضطرابات العضلات البدئية و الثانوية (الانهك العضلي)، اضطرابات الشوارد، اضطرابات التغذية
 - اضطرابات المراكز العصبية المنظمة
- $\uparrow \text{PCO}_2 \leftarrow$ الحماض التنفسي ، تعوض الكلية $\leftarrow$ فتخفض PCO_2

النفخ الرئوي Pulmonary emphysema

- تخرّب غير عكوس للنسيج الرئوي و تليف جدران الأسناخ
- التدخين أهم العوامل، بعض الأخماج، التلوث (الأميانت)
- الأذية سنخية بالدرجة الأولى
- الآليات المرضية:

١- الخمج المزمن بسبب تأذي البطانة التنفسية ووظيفة الأهداب المنظفة بسبب التدخين

٢- انسداد الطرق التنفسية الصغيرة بفرط إفراز المخاط والوذمة الالتهابية

النفخ الرئوي Pulmonary emphysema

٣- انتفاخ الأسناخ بسبب عدم القدرة

على إخراج الهواء (الانسداد) و الخمج



٤- تخرّب جدر الأسناخ تحت تأثير

إنظيمات الإستازو التربسين

المفرزة من البالعات السنخية

النتيجة الإجمالية: $PO_2 \downarrow$ و $PCO_2 \uparrow$

تدرجيا



طب بشري ٢٠١٩/٠٥/٠٩


د. عبد الحميد الملقى

الانخماص Atelectasis

- انخماص الأسناخ في جزء من الرئة أو في فص أو كامل الرئة
- أسبابه:


١- انسداد الطرق الهوائية: المفرزات المخاطية، ورم، جسم أجنبي ← ارتشاف الهواء من الأسناخ و امتلائها جزئياً بالسوائل ← ↑ المقاومة الوعائية في المنطقة المنخمة فيتحول الجريان إلى بقية المناطق فتحسن أكسجة الدم بشكل معاوض

٢- نقص الفعال بالسطح (السورفاكتانت): (داء الأغشية الهلامي)



ذات الرئة Pneumonia

- التهاب النسيج الرئوي: خمجي، شعاعي، كيميائي
- يصاب النسيج الرئوي بالوذمة بسبب $\uparrow$ النفوذية الشعرية وانسلاخ الخلايا الالتهابية البيضاء إلى النسيج الخلالي والأسناخ وقد تشمل الإصابة فصاً أو كامل الرئة
- تسبب $\uparrow$ ثخانة الغشاء التنفسي و $\downarrow$ مساحته
- $\downarrow$ التهوية/التروية



Normal alveoli



Pneumonia

الربو

- فرط فعالية العضلات الملساء في القصبات يترافق مع التهاب القصبات بسبب أرجي غالبا. يتفاعل ضد IgE المرتبط بالخلايا البدينة مع مستضده (بيئي أو داخلي) ← تنشيط الخلايا البدينة ← إطلاق الوسائط الالتهابية (الهستامين، البراديكينين، و اللوكوترينات) ← تفعيل الخلايا الالتهابية الأخرى و لاسيما الحمضات ←
 - وذمة موضعية في جدران القصبات
 - فرط إفراز المخاط
 - تشنج العضلات الملساء القصبية
- الأذية قصبية بالدرجة الأولى، عكوسة

الربو

- أثناء الشهيق : القصبات متوسعة بسبب الضغط السلبي داخل القفص الصدري ← لا يوجد صعوبة
- أثناء الزفير : ↑ الضغط داخل الرئة ← ↓ قطر القصبات بشكل طبيعي، عند وجود تشنج قصبي ← ↑ المقاومة لإخراج الهواء ← صعوبة زفيرية ← تطاول الزفير و ازدياد الحجم المتبقي ← الصدر البرميلي عند تفاقم الحالة