

الكيمياء الصيدلية ١

المحاضرة الثالثة

القسم العضوي ١


د. يوسف الأحمد

الكحولات والفينولات

- الكحولات: تنتج من استبدال هيدروجين أو أكثر من الفحوم الهيدروجينية الأليفاتية بجذر $-OH$.
 - الكحولات الأليفاتية:
 - الكحولات وحيدة الهيدروكسيل
 - المشتقات الهالوجينية للكحولات وحيدة الهيدروكسيل
 - الكحولات المضاعفة
 - الكحولات المعقدة
 - الكحولات التربينية
- الفينولات : تنتمي لمشتقات الفحوم الهيدروجينية الدورية وذلك باستبدال هيدروجين أو أكثر بجذر هيدروكسيل أو أكثر.
 - خواص الفينولات
 - أفراد هامة
 - الكشف والمقايسة

أولاً: الكحولات

- الكحولات الأليفاتية: (تقسم لوحيدة أو عديدة الهيدروكسيل)
- في الكحولات وحيدة الهيدروكسيل نميز بين الكحول الأولي والثانوي والثالثي حسب الكربون الذي يرتبط به الهيدروكسيل



- تزداد في الكحولات وحيدة الهيدروكسيل درجة الانصهار والغليان بازدياد الوزن الجزيئي
- درجة غليان الكحول الثانوي والثالثي أقل من مثيله الأولي.
- درجة الغليان والانصهار للكحول أعلى من مقابله من الفحم الهيدروجيني بسبب بوجود الرابطة الهيدروجينية بين هيدروجين مجموعة هيدروكسيل ضمن جزيئة كحول والزوج الإلكتروني الحر للأوكسجين ضمن جزيئة كحول أخرى.

3

أولاً: الكحولات

١ الكحولات وحيدة الهيدروكسيل

- العلاقة بين البنية الكيميائية والتأثير الفيزيولوجي:
- إن استبدال ذرة الهيدروجين في الفحم الهيدروجيني بجذر هيدروكسيل يخفض من التأثير المخدر والسمية كما وينعدم التأثير المخدر عند استبدال أكثر من ذرة هيدروجين كما في الغليكول:
- الايتان < الايتانول < الغليكول
- يزداد التأثير الفيزيولوجي والسمي حتى C8 ثم يبدأ بالانخفاض.
- يزداد التأثير أيضاً كما يلي: الغليكول ثم الكحول الأولي فالثنائي فالثالثي.
- الكحول الأليلي (غير مشبع) أعلى سمية من البروبانول (مشبع)




- **الميتانول: CH3OH**
- يمتزج مع الماء والايتر والايثانول
- تعود سميته إلى تأكسده في العضوية متحولاً للفورمول ثم لحمض النمل مما يسبب احمضاض الدم.
- يعطى المصاب لاكتات أو كربونات الصوديوم أو محلول غلوكوز لإبطال تأثير الفورمول على خميرة هيكسوكيناز.
- يسبب اذية في العصب البصري مسبباً العمى
- لا يستعمل صيدلانياً ولا محلاً للأدوية بل له أهمية صناعية ويستخدم كمذيب في التحاليل الصيدلانية (HPLC).



4

أولاً: الكحولات

• الايثانول: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$



- يؤكسد بثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ بوجود حمض الكبريت الكثيف فيعطي ألدهيد الخل الذي يعطي مع محلول نيتروبروسيات الصوديوم $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ والبيردين لوناً أزرق.
- كشف الميتانول ضمنه: تفاعل دينيجيس (كاشف كبريتات الزئبق) الذي يعطي الفورفورال والذي يلون كاشف شيف (بنفسجي). كاشف شيف: محلول الفوكسين المائي مع حمض الكبريتي



5

أولاً: الكحولات

• الذاتية (كشف الشوائب):

- الكحولات العالية : تفاعل كوماروفسكي: مع الدهيد الصفصاف وحمض الكبريت فيعطي لون أحمر.
- الشوائب المرجعة: مع نترات الفضة النشادرية والاسيتون وفق تفاعل ليغال حيث تتحرر الفضة بالتسخين وتترسب على جدران الأنبوب معطية المرآة اللماعة.
- الشوائب الحمضية والقلوية بالمقايضة بوساطة حمض أو أساس ٠.٠١ نظامي (مشعر أخضر بروم كريزول)
- الأسس الطيارة : كاشف نسلر (يوديد البوتاسيوم والزئبق ضمن البوتاس)

6

أولاً: الكحولات

• الإيتانول: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

• الاستعمال:

- يتمتع بتأثير مخدر خفيف لكن مدة مرحلة النشوة طويلة ومرحلة السبات قصيرة جداً والتي تنتهي بالموت.
- قاتل للجراثيم بتركيز ٧٠ % حيث يرسب بروتوبلازما الخلية الجرثومية.
- تطهير الجلد قبل الحقن.
- منبه في حالات الإغماء
- سواغ صيدلاني في كثير من الخلاصات و الأكاسير.

• تحديد التركيز في الدم:

- مبدأ استخدام خميرة الكحول نازعة الهيدروجين ADH.
- تلعب ADH دور وسيط بين الإيتانول و تمامة NAD نيكوتين أميد أدينين دي نكليوتيد:
- $$\text{Et-OH} + \text{NAD} \xrightarrow{\text{ADH}} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{NADH}_2$$
- يتم لجم ألدهيد الخل بمعالجته مع سيمي كاربازيد بهدف جعل التفاعل كمي.
- يعاير NADH_2 عند طول موجة ٣٤٠ نانومتر




7

أولاً: الكحولات

• البروبانول النظامي: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

- يغلي في الدرجة ٩٧.
- يتمتع بتأثير مخدر يفوق الإيتانول.
- قاتل للجراثيم ومطهر ويجب مزجه مع الماء.
- يعطي مع حمض الكبريت والفانيلين لون أحمر غامق بإضافة الماء

• البروبانول النظير $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$



- يغلي بالدرجة ٨١.
- يتمتع بتأثير مخدر ومطهر يفوق الشكل النظامي.
- يحضر بإرجاع الأسيتون
- يتأكسد بفوق كرومات البوتاسيوم معطياً الأسيتون والذي يكشف بتفاعل ليغال.


• الكحول الإيميلي الثاني

- يغلي بالدرجة ١٠١.
- يتمتع بتأثير منوم.
- لم يعد يستخدم بسبب تأثيره المخرش ورائحته الكريهة

8

كواشف الكحولات وحيدة الهيدروكسيل


- تعطي مع بارانترو بنزويل كلوريد مركبات بلورية ذات درجات انصهار وصفية
- تتأكسد بمحلول برمنغنات المشبع بوسط من حمض الكبريت وتعطي الكحولات الأولية للألدهيدات بينما تعطي الثانوية للكينونات.




9

أولاً: الكحولات

٢- المشتقات الهالوجينية للكحولات وحيدة الهيدروكسيل



- الايتانول ثلاثي البروم (أفيرتين)
- استعمل أساساً في التخدير
- غير ثابت مما سبب توقف استخدامه
- إن استبدال الهيدروجين في الكحول بالبروم أو الكلور يزيد من التأثير المخدر
- إن استبدال الهيدروجين في الكحول بالفلور أو اليود لا يغير من التأثير




- تري كلور البوتانول (كلوريتون)
- كحول ثالثي
- يحضر بمعالجة الأسيتون مع الكلوروفورم
- مهدئ ومنوم
- مطهر أقوى من الفينول
- مادة حافظة في القطورات الأنفية والعينية ومحاليل الفيتامينات والمهرمونات.

10


أولاً: الكحولات

٣ الكحولات المضاعفة

الكحولات المضاعفة: تحتوي جذري هيدروكسيل متجاورين وتسمى غليكولات وتتميز بدرجات غليان أعلى و أقل انحلالاً بالماء من الكحول وحيد الهيدروكسيل




- الايتلين غليكول:
- سائل يغلي بالدرجة ١٩٨°.
- يعطي بالتسخين مع حمض الكبريت دي أوكسان (محل هام) أما مع كلوريد الزنك فيعطي راسب بلوري أبيض.
- لا يعطي داخلياً بسبب أكسدته وتحوله لحمض الحماض
- تستخدم ايستراتة وحيدة الحمض كعوامل استقلابية (شمعات الايتلين غليكول مثلاً)



11

أولاً: الكحولات

٣ الكحولات المضاعفة



- البروبيلين غليكول:

• Propylene glycol has become widely used as a **solvent, extractant, and preservative in a variety of parenteral and nonparenteral pharmaceutical formulations.**

• It is a **better general solvent than glycerin** and dissolves a wide variety of materials, such as corticosteroids, phenols, sulfa drugs, barbiturates, vitamins (A and D), most alkaloids, and many local anesthetics.

As an **antiseptic** it is similar to ethanol, and **against molds** it is similar to glycerin and only slightly less effective than ethanol.

Propylene glycol is commonly used as a **plasticizer** in aqueous film-coating formulations.

in cosmetics and in the food industry : **carrier for emulsifiers and as a vehicle for flavors in preference to ethanol**, since its lack of volatility provides a more uniform flavor.

12


ثانياً: الفينولات

- **الخواص العامة:**
- ذات فعالية مضادة للجراثيم غير نوعية.
- **معادل الفينول phenol coefficient:** نسبة تمديد المادة القاتلة للجراثيم المدروسة إلى نسبة تمديد الفينول اللازمة لقتل سلالة من المكورات العنقودية ضمن شروط حرارة وزمن محددين وهذا المعادل يشير إلى القدرة المضادة للعفونة أو التأثير المثبت أو القاتل للجراثيم خلال مدة زمنية مقارنة مع الفينول.
- **SAR:**
- يزداد التأثير القاتل عند استبدال ذرة هيدروجين بهالوجين أما وجود أكثر من هالوجين فيقلل الانحلالية ويزيد السمية.
- إدخال NO₂ يزيد الفعالية بشكل معتدل.
- إدخال كربوكسيل لا يزيد من الفعالية.
- يزداد التأثير بإدخال جذر ألكيل وذلك حسب طول الجذر الألكيلي.

21

ثانياً: الفينولات


- **الفينول:** يصادف في الزعتر البري.
- بلورات تنصهر بالدرجة ٤٢°.
- تتحلل بالماء الحار بكل نسبة أما في البارد فبنسبة ضعيفة.
- يحضر من البنزن بطريقة hauck. التي تعطي الاسيتون والفينول



22

ثانياً: الفينولات


- الكريزولات:
- مشتق ميتيلي للفينول.
- يحتوي الكريزول الطبي على الشكل ميتا بنسبة ٥٠ %.
- الشكل ميتا سائل أما الشكلان أورثو وبارا بلورات عديمة اللون أو بنية مصفرة.
- ينحل ١ مل من الكريزول الخام ضمن ٥٠ مل ماء ويكون شديد الانحلال بالكحول.
- كريزول + حمض الأزوت يؤدي لتبخر الشكل أورثو وبارا وترسب الشكل ميتا على شكل مشتق ثلاثي النثرو والذي يفصل ويقايس وزنياً.
- يبلغ معادل الفينول بالنسبة للكريزول ٢.٥ ويعتبر مضاد تعفن.
- المشتقات الهالوجينية أقل تخريشاً و أعلى تأثيراً. (الكلوروكريزول والكلوروكسيلينول).



23

ثانياً: الفينولات

- الثيمول: يصادف في الزعتر البري.
- بلورات ذات رائحة خاصة تنصهر بالدرجة ٥١°.
- أعلى تأثيراً من الفينول بـ ٣٠ مرة و أقل سمية بأربع مرات.
- مضاد عفونة معوية وطارد ديدان.
- معاجين الأسنان ومحاليل الفم المطهرة.
- يحضر اعتباراً من ميتا كريزول



24


ثانياً: الفينولات

- المقايضة:
- تتفاعل مع كاشف ميلون (محلول الزئبق في حمض النتريك) وتعطي لوناً أصفر أو أحمر (ذاتية).
- تعطي مع الالدهيدات في وسط حمضي كثيف تفاعلات لونية وصفية.
- تعطي مع املاح دي ازونيوم ملونات الازو والتي تقايس لونياً.
- مقايضة الفينول حسب دستور الأدوية:


يتم معايرة الفينولات بمعايرات تحرير اليود Iodine displacement titrations من اليوديد باستخدام عامل مؤكسد قوي ثم يعاير اليود المتحرر بثيوسلفات الصوديوم.

مقايضة الفينول السائل:

يتولد البروم الحر من تفاعل بروميد البوتاسيوم مع حجم محدد من محلول عياري من برومات البوتاسيوم.



يتحرر البروم و يتفاعل مع الفينول بنسبة ١ مول فينول إلى ٣ مول بروم.



يتفاعل البروم الحر المتبقي عن التفاعل مع اليوديد مما يولد اليود الحر الذي يعاير بثيوسلفات الصوديوم و الذي يعبر عن زيادة البروم الحر.



25

ثانياً: الفينولات

ASSAY

- المقايضة:
- مقايضة الفينول حسب دستور الأدوية:

Dissolve 2.000 g in water R and dilute to 1000.0 ml with the same solvent. Transfer 25.0 ml of the solution to a ground-glass-stoppered flask and add 50.0 ml of 0.0167 M bromide-bromate and 5 ml of hydrochloric acid R, close the flask, allow to stand with occasional swirling for 30 min and then allow to stand for a further 15 min. Add 5 ml of a 200 g/l solution of potassium iodide R, shake and titrate with 0.1 M sodium thiosulphate until a faint yellow colour remains. Add 0.5 ml of starch solution R and 10 ml of chloroform R and continue the titration with vigorous shaking. Carry out a blank titration.

C₆H₆O 94.1

1 ml of 0.0167 M bromide-bromate is equivalent to 1.569 mg of C₆H₆O

26