

الباب الثالث

مسكنات الألم المركزية

LES ANALGESIQUES CENTRAUX

يعد الافيون Opium من أقدم مسكنات الألم التي استعملت في المد
فين هو احد قلويدهاته الرئيسة التي عزلت في اوائل القرن الماضي .
الخواص الفارماكولوجية المتعددة للمورفين اتجهت البحوث نحو اصط
ت تغلب فيها احدى هذه الخواص او بعضها على الخواص الفارماكوا
ى . وقد تحقق ذلك في مركبات تحوي في بنيتها على النواة الرئيس
ين أو قسم من هذه النواة .

ان اول مركب اصطناعي من سلسلة مخلفات المورفين ظهر في عام
بيتيدين وهو من مشتقات ٧ فينيل بيبيريدين التي تشكل قسما من
بن ، ثم ظهر الميتادون ومشتقات المورفينان ، والعديد من المركبات الاصط
رى .

المورفين ومشتقاته




Morphine et Dérivés

Morphine المورفين

البنية العامة :

يحتوي المورفين في بنيته المشتقة من الاوكتايدروفييناقرين على الوظائف الكيميائية التالية :

- وظيفة هيدروكسيلية فينولية على الفحم (٣) في الحلقة (A)
- وظيفة هيدروكسيلية غولية على الفحم (٦) في الحلقة (C)
- وظيفة ايتيرية مكونة جسرا او كسيجنيا بين الفحمين (٤ - ٥)
- رابطة مضاعفة بين الفحمين (٧ - ٨) في الحلقة (C)
- وظيفة امينية ثالثة تحمل جذر ميثيل



الاستحصال :

يستحصل المورفين عمليا بطريقة الاستخلاص Extraction من الافيون على الرغم من انه قد امكن اصطناعه كيميائيا ، ولكن تبقى عملية الاستخلاص اقل كلفة من ناحية اقتصادية •

الصفات Caractères :

الفيزيائية :

يتبلور المورفين الطبي مع جزيء ماء واحد ، ويوجد بشكل بلورات لماعة عديمة اللون ، مثرة الطعم ، تفقد ماءها البلوري بالدرجة (١١٠) ° • قليلة الانحلال

في الماء والايتر ، تنحل في الغول ، لا تنحل في الخلون . محاليل المورفين
الغولية (١٪) تحرف النور المستقطب نحو الایسر .

الكيميائية :

يعطي المورفين تفاعلات الوظائف الكيميائية الموجودة في بنيته :

أ - تفاعلات الوظيفة الامينية الثالثة (آزوت عضوي) :

— يعد المورفين اساسا وحيد المعادل Base monovalente يعطي املاحا مع
الحموض المعدنية ، ويرسب بكواشف أشباه القلويات .
— تعطي الوظيفة الامينية الثالثة بالاكسدة بواسطة الماء الاوكسجيني وظيفة
امينو او اكسيد ، ويسمى المورفين عندئذ جينومورفين Genomorphine .

ب - تفاعلات الوظيفة الفينولية :

— ينحل المورفين في المحاليل القلوية ويعطي مركبات تدعى المورفينات
(صوديوم ، بوتاسيوم ، كالسيوم) ، ولكنه لا ينحل في الشادر ولهذا
يترسب المورفين من محاليله القلوية عند اضافة كلور الامونيوم .

— يعطي المورفين مشتقات ايتيرية وايتيرية .

— يعطي المورفين مع فوق كلور الحديد لونا بنفسجيا ويحول وجود الحموض
والاغوال والحرارة دون ظهور اللون .

— يعطي المورفين تفاعلات الارجاع فهو يرجع فرى سيانور البوتاسيوم الى
فرو سيانور البوتاسيوم ويحرر اليود من حمض فوق اليود (HIO_4)
(امكانية المعايرة) ، ويرجع محلول السلفوموليدي مع اعطاء لون بنفسجي
يتغير بالحرارة ، ويعطي مع الماء الاوكسجيني والشادر وقليل من كبريتات
النحاس لونا زهريا يتحول الى احمر .

ج - تفاعلات الوظيفة الغولية الثانوية :


— يكون المورفين ايسترات مع الحموض العضوية .

— يتأكسد المورفين ويتحول الى مورفينون Morphinone .

د - تفاعلات الرابطة المضاعفة :

يعطي المورفين بالهدرجة مركب الذي هيدرومورفين Dihydro morphine .

هـ - يتحول المورفين بتأثير الحموض أو القلويات المركزة بالحرارة الى الابومورفين Apomorphine الذي ليس له أي تأثير مسكن انما يستعمل مقيئا Vomitif .



ابومورفين

كلوريدات المورفين Chlorhydrate de Morphine

Mor, HCl, 3H₂O

• تبلور كلوريدات المورفين مع ثلاث جزيئات ماء تفقدها بالدرجة (١٠٠) ° .

الصفات :

- بلورات ابرية طويلة عديمة اللون ذات طعم مر شديد تنحل في الماء والغول .
- تحرف محاليلها المائية (٢٪) النور المستقطب نحو اليسر Levogyre .
- اذا عولجت المحاليل المائية بالبوتاس أو الصود يترسب المورفين ، ولكنه ينحل بزيادة القلوي ، اما اذا عولجت بالنشادر فيترسب المورفين .

المعايرة :

تعاير كلوريدات المورفين في وسط لامائي ، باذابتها بحمض الخل المبلور ،

يضاف قليل من محلول خلات الزئبق في حمض الخل ، وتعاير بـ حمض فوق الكلور
عشر النظامي بوجود البنفسجية المبلورة • تسلك كلوريدات المورفين سلوك
الاسس وحيدة المعادل Base monovalente .

الاستعمال والتأثير الفيزيولوجي للمورفين واملاحه :

يؤثر المورفين على الجملة العصبية المركزية فهو مسكن للآلم ، مثبط لمركز
التنفس ، منوّم ، مضاد للسعال Antitussif .

يؤثر المورفين ايضا مثبطا على بقية المراكز العصبية الاخرى ، ولكن بصورة
أخف ويؤدي تناوله الى الشعور بالنشوة (الشفق) Euphorie والابتعاد عن العالم
الخارجي ويحرض على التخيلات اللاواقعية ويضعف القدرة الارادية للانسان •
وهو من مسببات التسمم بالادمان Toxicomanie .

ملاحظة :

عند تناول المورفين بمقادير خفيفة وبخاصة في بداية المعالجة فان الكمية
المتبعة منه تكون قليلة نسبيا فيؤثر بهذه الحالة تأثيرا منها Stimulant للجملة
العصبية المركزية ويسبب الهيجان Excitation والغثيان حتى الاقياء •

يستعمل المورفين في تسكين الآلام الناتجة عن التشنجات الحشوية
Spasme vicéraux وفي حالة الأرق Insomnie المؤلم قبل العمليات الجراحية
وبعدها •

يبدأ تأثير المورفين بعد (٢٠) دقيقة من تناوله ويستمر مدة (٤ - ٦)
ساعات • يستعمل المورفين أو كلوريداته بمقدار (١٠) ملغ حقنا تحت الجلد
من محلول (١٪) أو بشكل شراب (٥٠٪) •

التأثيرات الجانبية للمورفين :


يعد المورفين نموذج المركبات المنومة والمسكنة المركزية • ولكنه يؤدي
بعض العقبات التي تحول دون استعماله المتكرر ، فله تأثيرات عديدة جانبية :

- تأثير منه في بداية العلاج ويسبب القيء •
- يسبب الإمساك Constipation ، إذا أخذ عن طريق الفم ، وذلك نتيجة تأثيره المباشر على عضلات الأمعاء •
- يطور بسرعة عند المعالجين به نوع من الاعتياد والادمان على طلب المزيد منه فيسبب التسمم بادمان المورفين Morphomanie .

مشتقات المورفين

- لقد امكن الحصول على مشتقات عديدة للمورفين وذلك باجراء بعض التعديلات الكيميائية في مستوى المجموعات الوظيفية في بنيته • والمشتقات الناتجة تتمتع بخواص فارماكولوجية مختلفة بقليل أو كثير من خواص المورفين •
- أما أهم هذه المشتقات ذات التأثير المسكن هي : الجينومورفين ومشتقات المورفين الايتيرية •


جينومورفين Genomorphine



- هو امينواوكسيد المورفين • يستحصل عليه بتأثير الماء الاوكسجيني على المورفين •

- يتمتع الجينومورفين بالخواص الفارماكولوجية للمورفين نفسها ، ولكن بشكل اضعف ، فهو قليل السمية ولا يسبب الاعتياد الا بعد فترة طويلة من الاستعمال • يستعمل مهدئا • وفي معالجة التسمم باعتياد المورفين حيث يعطى بدلا منه بمقدار (٤٠) ملغ حقنا بالعضل وهذا ما يعادل (١٠) ملغ من المورفين •

كلوريدات النالورفين Chlorhydrate de Nalorphine



هو أليل المورفين N. allyl Nor Morphine حيث يحل الجذر أليل بدلا من جذر ميتيل على الآزوت في بنية المورفين •

الصفات :

بلورات دقيقة بلون ابيض أو ابيض مصفر ، طعمها مر ، تتلون ببطء عند تعرضها الى النور • تنحل في الماء ، قليلة الانحلال في الغول ولا تنحل في الايتر ولا في الكلوروفورم • تحرف النور المستقطب نحو الايسر •
تعطي تفاعلات شاردة الكلور • وتعطي مع محلول السلفوموليبيدي لونا ارجوانيا غامقا يتحول الى اخضر • وتعطي مع محلول فوق كلور الحديد لونا أزرق •


الاستعمال :

يختلف تأثير كلوريدات النالورفين باختلاف حالة المريض ، فعند المرضى غير الخاضعين للمعالجة بالمورفين فان تأثيرها الفارماكولوجي يكون خفيفا جدا اذا ما قورن بتأثير المورفين •

أما عند المرضى الخاضعين للمعالجة بالمورفين أو أحد مخلفاته (ميتادون) فان تأثيرها يكون عكسيا تماما وبخاصة تأثيرها المضاد لتأثير المورفين على مركز التنفس • ولهذا فان كلوريدات النالورفين تستعمل عند التسميم بالمورفين بمقدار (٥ - ١٠) ملغ كل (١٠ - ١٥) دقيقة حقنا بالوريد ، حيث تنشط مركز التنفس • وبكل الاحوال يجب أن لا يزيد المقدار على (٤٠) ملغ في اليوم •

كلوريدات النالكسون Chlorhydrate de Naloxone

(Narcan)



naloxone

هو الليل نورمورفين N-allyl Nor Morphine كما هو في بنية النالورفين
انما يحمل مجموعة هيدروكسيل على الفحم (١٤) • يستعمل بشكل ملح
كلوريدات •

الصفات :

مسحوق بلون أبيض ، ينحل في الماء وفي محاليل الحموض الممددة ، وفي
محاليل القلويات المركزة • قليل الانحلال في الغول ، لا ينحل في الكلوروفورم
والايتير • تحرف محاليله المائية النور المستقطب نحو الايسر •









الاستعمال :

يعد النالكسون من المضادات النوعية للمورفين ومشابهااته الاكثر فعالية
وبخاصة في مركز التنفس • وهو أقوى بـ (١٠ - ٣٠) مرة من النالورفين وليس
له أي تأثير مشابه للمورفين •

يستعمل في معالجة المتسممين بالمورفين والمدمنين على الهيروئين ، فاذا أعطي
حقنا يبدأ تأثيره بعد (٢ - ٣) دقائق • أما عن طريق الفم فيلزم مقدار أكبر •
تستعمل كلوريدات النالكسون بمقدار (٤٠٠) ميكرو غرام حقنا تحت الجلد ،
أو في العضل أو في الوريد ، يمكن ان تكرر بعد عدة دقائق اذا لزم الامر •

ايتيرات المورفين ومشتقاتها

هي عبارة عن المشتقات الايترية للوظيفة الهيدروكسيلية الفينولية للمورفين أو للمورفينون ، وبعضها مثل التيبائن *Thébaine* عبارة عن مشتقات ايترية للوظيفتين الهيدروكسيلية الفينولية والغولية معا . وفيما يلي أهم هذه الايترات :



ايتيرات المورفين الدستورية

وهي ايتيرات الوظيفة الهيدروكسيلية الفينولية للمورفين وأهمها :

الكودئين Codéine :

هو الايتر الميثيلي للمورفين . يستعمل بشكله الاساس الذي يتبلور مع جزئي ماء أو بشكل أملاح : فوسفات الكودئين أو كلوريدات الكودئين أو كبريتات الكودئين .

هو الايتر الايتيلي للمورفين • يستعمل بشكل ملح كلوريدات •

الفولكودين Pholcodine :

وهو ايتر مورفولين ايتيل مورفين • يستعمل بشكله الاساس أو بشكل ملح
طرطرات الفولكودين •

الاستحصال :

تستحصل بطريقة استحصال الايتيرات العامة : تأثير هالوجين أو كبريتات
الالكيل على المورفين في وسط قلوي •

الصفات :

الفيزيائية :

الاسس Bases (كودئين - فولكودين) :

بلورات عديمة اللون والرائحة ذات طعم مر ، تفقد الماء البلوري بالدرجة
(١٠٠ °) • اذا سخنت بالماء فانها تنصهر وتشكل قطرات زيتية • لا تنحل في الماء.
تنحل بالغول • تحرف النور المستقطب نحو اليسر •

الاملاح Sels : (فوسفات الكودئين - كلوريدات الديونين)

تنحل في الماء وفي المذيبات العضوية •

الكيميائية :

— لا تعطي تفاعلات الوظيفة الفينولية للمورفين ، فالاسس لا تنحل في المحاليل
القلوية ، أما الاملاح المنحلة فانها تترسب بمعالجتها بالصود ، ولكنها لا
تترسب باضافة النشادر (اختلاف مع المورفين) •

— عندما تعالج مع حمض الكبريت وبالحرارة فانها تعطي التفاعلات الملونة
للمورفين •

الاستعمال :

ان تحويل الوظيفة الفينولية الى وظيفة ايتيرية يؤدي الى انقاص الفعالية بشكل عام مع الاحتفاظ بالتأثير المضاد للسعال كما هو الحال في المورفين ولهذا تستعمل هذه الايتيرات مضادة للسعال Antitussifs .


- الكودئين : يعطى بمقدار (٢٠ - ١٠٠) ملغ في اليوم عن طريق الفم .
- الديونين : يعطى بمقدار (١٠٠) ملغ باليوم بشكل شراب ، مضغوطات ، تحاميل .
- الفولكودين : يعطى بالمقادير السابقة نفسها .

مسكنات الألم المركزية الاصطناعية

Analgesiques Centraux de Synthèse

١ - كلوريدات البيتيدين Chlorhydrate de Péthidine

(Dolosal) (Dolantine) (Mépridine)



التركيب :

- كلوريدات ميتيل - ١ فينيل - ٤ بيبيديدين - كاربوكسيلات - ٤ الايتيل .


استعمل البيتيدين في بداية الامر لأجل تأثيره المضاد للتشنج

Anti Spasmodique تحت اسم دولانيتين Dolantine ثم اعترف به مسكنا مركزيا

• للالم واستعمل تحت اسم دولوزال Dolosal

الاستحصال :

توجد طرق عديدة لاستحصال البيتيدين اعتبارا من نتريل فينيل حمض الخل الذي يقدم الجزء الاعلى من البنية • وبسط هذه الطرق تعتمد على معالجة نتريل فينيل حمض الخل مع سلسلة امينية ثنائية الهالوجين (دي كلور دي ايتيل - ميتيل امين) ثم تحويل الوظيفة النتريلية في المشتق الناتج الى وظيفة ايسترية •



الصفات :

مسحوق مبلور ابيض ذو طعم خفيف وواخز ، ينحل في الماء والغول والخلون • يعطي تفاعلات اشباه القلويات • يعطي مع حمض الكبريت الفورمولي لونا ورديا يمكن استخدامه في المعايرة • يعطي تفاعلات شاردة الكلور •

المعايرة :

هي معايرة ملح اساس ضعيف في وسط لا مائي Non aqueux : يذاب حوالي (٢٥٠) ملغ موزونة بدقة في (٤٠) مل من الخلون ثم يضاف (٥) مل محلول خلات الزئبق (٥٪ في حمض الخل) وعدة قطرات من الهلياتين • يعاير بحمض فوق الكلور عشر النظامي • تسلك كلوريدات البيتيدين سلوك الاسس وحيدة المعادل Base monovalente .

التأثير الفيزيولوجي والاستعمال :

يملك البيتيدين بعض خواص المورفين الفارماكولوجية ، فهو مسكن مركزي للآلام ($\frac{1}{6}$ فعالية المورفين) ولكنه أقل سمية وأقل تأثيراً على مركز النوم والتنفس من المورفين ، وليس له أي تأثير مقيء . يتمتع أيضاً ببعض خواص الأتروبين فهو حال للتشنج Spasmolytique (قسبات ، أمعاء ، أوعية) فيستعمل مسكناً للآلام الناتج عن التشنج العصبي والعضلي ، ويعطى بمقدار (٥٠ - ١٠٠) ملغ بشكل مضغوطات ، أو تحاميل ، أو حقناً بالعضل .

٢ - مشتقات البيتيدين :


علاقة البنية - التأثير :

نظراً للخواص الدوائية التي يتمتع بها البيتيدين كأول مركب مسكن للآلام مركزي اصطناعي ، فقد تمت دراسة هذا المركب بعناية من حيث علاقة البنية - التأثير وذلك بغية الحصول على مركبات ذات فعالية دوائية اصطنائية أكثر أو الحصول على مركبات ذات فعالية قوية مسكنة مركزية للآلام .

نذكر هنا التعديلات الرئيسية التي تمت على هذه البنية والمركبات المستعملة .

١ - استبدال مجموعات الكيلية مختلفة بمجموعة الميتيل المحمولة على الآزوت :

تبين اللوحة التالية مجموعة المركبات المشتقة من البيتيدين المتبادلة بجذور الكيلية مختلفة على ذرة الآزوت في نواة البيريدين :



الفينو بيريدين (Operidine) Phenoperidine

يستعمل الفينو بيريدين بشكل ملح كلوريدات ، ويعطى في مواضع استعمال البيتيدين وفي التخدير بشكل عام بمقدار (٢ - ٥) ملغ •

البيمينودين Piminodine :


يستعمل مسكنا مركزيا للآلم كما هو الحال في استعمال المورفين ويعطى بمقدار (٢٥ - ٥٠) ملغراما في اليوم •

الانيليريدين Anileridine :

يستعمل بشكله الاساس أو بشكل املاح : كلوريدات الانيليريدين أو كبريتات الانيليريدين •

يستعمل مسكنا مركزيا للآلم كما هو الحال في استعمال المورفين ويعطى بمقدار (٢٥ - ٥٠) ملغراما في اليوم •

٢ - استبدال مجموعة سيتونية بمجموعة الايستر :




وقد تم ذلك في بنية السيتويبيميدون Cétoximidon حيث يستعمل في مواضع استعمال المورفين ويعطى بمقدار (٥ - ١٠) ملغ في اليوم •

٣ - ادخال مجموعات مختلفة على النواة العطرية :


وقد ظهر ذلك في بنية المركب السابق السيتويبيميدون •

٤ - استبدال مجموعة غولية بمجموعة الايستر :

وقد تم ذلك في بنية الفابرودين Alphaprodine والثريميبيدين Trimeperidine حيث يسلكان بنية قريبة من بنية البتيدين التي تكون فيهما المجموعة الغولية بشكل ايستر .




Trimeperidine



Alphaprodine

يستعمل الالفابرودين كمسكن مركزي للالم كما هو الحال في استعمال البتيدين ولكنه أكثر سرعة في التأثير وأقل مدة . يستعمل قبل العمليات الجراحية قصيرة المدة وبعدها ويعطى بمقدار (٢٠ - ٦٠) ملغراما حقنا تحت الجلد حيث يستمر التأثير لمدة ساعتين .

٣ - الميتادون Methadone



التركيب :

دي ميتيل امينو - ٦ دي فينيل - ٤ ، ٤ هيتانول - ٣ . يحوي الميتادون في بنيته على فحم غير متناظر Asymétrique ، فيوجد له مماكبان Isomères ضوئيان (+) و (-) . والمركب الطبي هو المركب المترازم (الرزيم) Racémique الذي يستعمل بشكل ملح كلوريدات .

الاستحصال :


يستحصل على الميتادون اعتبارا من الدي فينيل اسيتو فتريل ، ان الهيدروجين

المرتبط بالفحم الوسطي من هذا المركب هو هيدروجين نشيط حيث يمكن استبدال الصوديوم به والمشتق الناتج يمكن ان يتفاعل بسهولة مع المشتقات الهالوجينية . يتم الاستحصال بمرحلتين :

١ - انضمام الدي فينيل اسيتو نتريل مع كلورو - ٢ دي ميثيل امينو - ١ بروبان ، بوجود اميدور الصوديوم (Na NH₂) .

يؤدي هذا التفاعل الى تشكل مابين للمشتق النتريلي الناتج ، لان المشتق الكلوري المستعمل يتفاعل تحت شكل ايتلين - ايمينوم *éthylène - iminium* نتيجة لتشكل ملح داخلي . الماكبان المتشكلان بنسبة متساوية يقودان الى الميتادون وايزوميتادون .

٢ - معالجة المشتق النتريلي السابق مع بروم ايتيل المغنزيوم .



الصفات :


مسحوق ابيض ، مر الطعم ، قليل الانحلال في الماء ، ينحل في الكلورفورم .
ان المجموعة الكربونيلية (—CO—) في بنية الميتادون هي مجموعة ضعيفة النشاط
الكيميائي نتيجة لتوضعها الفراغي .

الاستعمال :

يتمتع الميتادون بتأثير مسكن للالم وتأثير مضاد لتشنج العضلات ، وتأثيره
المسكن أقوى من تأثير المورفين ، ولكنه اكثر سمية ويسبب الاعراض الثانوية
نفسها (غشيانا - قيئا - اعتيادا) .

يعطى بمقدار (٢٥ - ١٠) ملغ باليوم عن طريق الفم أو حقنا بالعضل أو
بشكل تحاميل .

٤ - ديكسترو موراميد (Palfium) Dextromoramide



البنية :


يعد الديكسترو موراميد من مشتقات الميتادون مع استبدال وظيفة اميدية
بالوظيفة الكربونيلية . يحتوي على فحم غير متناظر فيوجد له مماكبان ، المركب
الفعال هو المماكب الميمن Dextrogyr والذي له فعالية دوائية اقوى من المماكب
الآخر . يستعمل بشكل ملح طرطرات حامضة .

الاستعمال :

مسكن مركزي للالم اقوى من المورفين بخمس مرات وسميته معادلة لهذا

الآخر ، يبدأ التأثير بعد (١٠ - ١٥) دقيقة من تناوله ويدوم (٤ - ٦) ساعات •
 يعطى بمقدار (٥ - ٢٠) ملغراما عن طريق الفم • يسبب التأثيرات الجانبية نفسها
 ويعالج المتسممون به بالنالورفين •

٥ - ديكسترو بروكسيفين Dextropropoxyphene
 (Antalvic) (Di-Antalvic) (Doloxen) (Algaphan)



يدعى ايضا بروبروكسيفين D-Propoxyphene D

علاقة البنية - التأثير :

يعد الديكستروبروبوكسيفين من مشتقات الديكستروموراميد حيث تم
 استبدال مجموعة بنزيل $(C_6H_5-CH_2-)$ بمجموعة الفينيل واستبدال مجموعة
 ايسترية بمجموعة الاميد • يحتوي هذه المركب على فحمين غير متناظرين فيوجد له
 مماكبان (زميران) مترازمان Racémiques الفا (a) وبيتا (β) ، ولكل منهما
 مركبان متخيلان Enantimorphes (ميسر وميمن) • المركب الميمن
 Dextropropoxyphene هو الاكثر فعالية والمستعمل تجاريا • يستعمل بشكل ملح
 كلوريدات أو نابسيلات Napsylate الديكستروبروبوكسيفين .

يتمتع هذا المركب بتأثير مسكن للالم أضعف من المورفين (- الفعالية) •


ولكنه لا يسبب التسمم بالاعتیاد ، ولهذا فانه يصنف مع المركبات المسكنة غير
 المخدرة «Non narcotic analgesics» .

تحتوي بنية الديكسترو بروبوكسيفين من جهة أولى على قسم من بنية مضادات الهيستامين من نموذج الذي فينيل هيدرامين (Benadryl) ، ومن جهة ثانية على قسم من بنية المسكنات المركزية للآلام من نموذج الميتادون (إسترات من نموذج البنزيدرول Benzhydrol التي تسلك سلسلة أمينية مشابهة لتلك الموجودة في بنية الميتادون)

الاستحصال :

يتم اصطناع الديكسترو بروبوكسيفين بطرق كيميائية متعددة ، نذكر من هذه الطرق تلك الطرق التي تعتمد على معالجة البرويوفينون مع الفورمول والذي إيتيل أمين حسب تفاعل مانيش Mannich . ثم يخضع المركب الأمينوسيتون لمتشكل إلى تفاعل غرينيار Grignard بالمعالجة مع برومور بنزيل المغنزيوم . ثم يؤستر المشتق الغولي الناتج بواسطة كلورور البرويونيك أو بلا ماء حمض البرويونيك فيشكل الديكسترو بروبوكسيفين .

يحتوي هذا المركب على فحمين غير متناظرين فله أربعة مماكبات ضوئية ومركبان مترازمان يكون أحدها (الميمن) هو الأكثر فعالية وهو المستعمل تجارياً .



الصفات :

كلوريدات الديكسترو بروبوكسيفين :

مسحوق بلون أبيض أو أبيض مصفر ، عديم الرائحة ، ذو طعم مر ، ينصهر

بدرجة (١٦٣ - ١٦٨) ° • ينحل في الماء والغول والكلوروفورم والخلون ولا ينحل في الايتر • محلوله المائي يحرف الضوء المستقطب نحو اليمين •

نابسيلات الديكسترو بروبوكسيفين :

وهو ملح نافثالين - ٢ سلفونات الديكسترو بروبوكسيفين المتبلور مع جزيء واحد من الماء •

مسحوق بلون أبيض ، عديم الرائحة ، ذو طعم مر ، ينصهر بدرجة حرارة ما بين (١٥٨ - ١٦٥) ° • كل (١٠٠) ملغ من هذا الملح تعادل (٦٦) ملغ من كلوريدات الديكسترو بروبوكسيفين • لا ينحل في الماء • قليل الانحلال في الغول والكلوروفورم • ينحل في الخلون وفي الغول الميثيلي • محلوله في الغول أو في الكلوروفورم يحرف الضوء المستقطب نحو اليمين • يحفظ في أوعية مغلقة •

الاستعمال :

يتمتع الديكسترو بروبوكسيفين بتأثير مسكن للآلم مشابه للميتادون ولكنه أضعف منه بـ (٥) مرات • يعطى في معالجة الآلم متوسط الشدة وله تأثير خفيف كمسكن للسعال •


يستعمل بالمشاركة مع مسكنات الآلم خافضات الحرارة ومضادات الالتهاب مثل الاسبيرين والباراسيتامول ، ويعطى بمقدار (٦٥) ملغراما من ملح الكلوريدات أو (١٠٠) ملغ من ملح النابسيلات تكرر على ثلاث مرات أو أربع مرات يوميا • وان استعماله المتكرر ولمدة طويلة يمكن ان يسبب الادمان من النموذج الذي يسببه استعمال المورفين •

يسبب استعماله بالمقدار العلاجي بعض الاعراض الثانوية الخفيفة مثل الاضطرابات المعدية - المعوية والكبدية •

٦ - مشتقات المورفينان Morphinane

المورفينان هي النواة الموافقة للمورفين ولكنها لا تحوي أية وظيفة كيميائية متبادلة •

ان اول مركب اصطناعي من هذه المشتقات هو ميتيل مورفينان ، ومع ان هذا المركب يتمتع بخواص مسكنة للالم ، إلا أنه لم يستعمل في المداواة •




Morphinane
مورفينان

Methymorphinane
ميتيل مورفينان

أما مشتقات المورفينان المستعملة هي :

ليفورفانول Levorphanol (Dormoran)



hydroxy-3-N-méthyl Morphinane

التركيب :


هيدروكسي - ٣ ميتيل مورفينان • يستعمل بشكل ملح طرطرات •

الاستعمال :

تتمتع طرطرات الليفورفانول بتأثير مركزي مسكن للآلم مشابه لتأثيرات المورفين إنما بشكل أقوى •

تستعمل في مواضع استعمال المورفين وتعطى بمقدار (١٥ - ٤٥) ملغ عن طريق الفم أو الحقن ، وتأثيرها المسكن يبدأ بعد (١٠ - ٣٠) دقيقة من تناول الجرعة • ويستمر التأثير مدة (٦ - ٨) ساعات • ويمكن ان تستعمل حقنا في التخدير •

ديكستروميتورفان Dextromethorphan (Romilar)



Méthoxy-3-N-méthyl Morphinane
J - MÉTHORPHANE (HBr)

التركيب :

ميتوكسي - ٣ ميتيل مورفينات • ويستعمل بشكل ملح بروميدرات •
لقد تم اصطناع هذا المركب تقليدا لبنية ايترات المورفين التي تتمتع بتأثير مضاد للسعال • حيث تم تحويل المجموعة الهيدروكسيلية الفينولية في الموضع (٣) الى مجموعة ايترية •


الاستعمال :

يستعمل الديكسترو ميتورفان في مواضع استعمال الكودئين أو الفولكودين مسكنا للسعال • وليس له أي تأثير مسكن أو مهدئ • يعطى بمقدار (١٥ - ٣٠)

ملغراما في اليوم للبالغين و (٣ - ٧) ملغرامات للأطفال حسب العمر عن طريق الفم بشكل مضغوطات أو شراب أو اقراص مص Lozenges .

ليفالورفان Levallorphan

(Lorfan)



Levallorphan

التركيب :

- N - الليل هيدروكسي - ٣ مورفينان ، ويستعمل بشكل ملح طرطرات .
- لقد تم اصطناع هذا المركب بالمشابهة مع النالورفين ، حيث أدخلت مجموعة الليل Allyle على الازوت في بنيتة هيدروكسي - ٣ مورفينان .


الاستعمال :

- يستعمل الليفالورفان في مواضع استعمال النالورفين . فبالمقدار الخفيف نسبيا فإن تأثيره يعاكس تأثير المورفين في مركز التنفس ، وبالمقدار الأكبر نسبيا فإنه يعاكس تأثير المورفين المسكن للألم وهكذا يستعمل مضادا للتسمم بالمورفين كما هو الحال في استعمال النالورفين بالنسبة للمورفين . يعطى في بداية العلاج بمقدار (١) ملغ حقنا في الوريد تتبع بمقدار (٥ر٠) ملغ على مرة أو مرتين إذا لزم الامر .

٧ - مشتقات البنزومورفان Benzomorphanes


تتألف نواة البنزومورفان من اتحاد نواتين : الاولى هي نواة بنزين متبادلة والثانية هي نواة المورفان Morphan المكونة بدورها من اتحاد حلقة سيكلوهكزان مع حلقة بيريدين .

ان اهم مشتقات البنزومورفان هي :
الميتازوسين والفينازوسين والبنزازوسين :



البنزازوسين Pentazocine

(Fortal)



علاقة البنية - التأثير :

لقد كان اكتشاف مشتقات البنزومورفان وبشكل خاص البنزازوسين حيلة البحوث التي تمت من اجل الحصول على مركبات ذات تأثير اصطفائي أو نوعي لاحد تأثيرات المورفين وبشكل خاص الحصول على مركبات مسكنة للالم أو

مضادة للسعال لا تسبب الادمان أو ليس لها التأثيرات الجانبية التي يسببها المورفين •

فنجند في بنية البنتازوسين من جهة اولى انه قد تمت المحافظة على قسم كبير من بنية المورفين فيها أي بنية الغاما (γ) فينيل بييريدين ، ومن جهة ثانية فان هذه البنية تحوي جذر الليل المتبادل على ذرة الازوت ، وذلك بالمشابهة مع بنية الالمورفين ، حيث يشير ذلك الى ان هذا المركب يعاكس أحد تأثيرات المورفين كما هو الحال في تأثيرات النالورفين بالنسبة للمورفين •

الاستعمال :

يستعمل بشكل ملح كلوريدات أو بالميتان •
يتمتع البنتازوسين بفعالية مسكنة للالم مركزية أقل بثلاث مرات أو اربع مرات من المورفين ، ويتمتع ايضا ببعض الفعالية المضادة للمورفين بخاصة في مركز التنفس وذلك لوجود جذر الالليل كما هو الحال في النالورفين •
يستعمل البنتازوسين في معالجة الالم بكل أنواعه ويعطى بمقدار (٢٠ - ١٥٠) ملغراما في اليوم على عدة دفعات • لا ينصح باعطائه لفترة طويلة لانه يسبب اعراضا ثانوية كالغثيان والقيء ويمكن ان يسبب الادمان •

فينازوسين (Narphen) Phenazocine

لا تختلف بنية الفينازوسين عن بنية البنتازوسين إلا بطبيعة الجذر المتبادل على الازوت فهو في هذا المركب عبارة عن جذر فينيل ايتيل ، ويستعمل الفينازوسين بشكل ملح بروميدرات •

وهو مسكن مركزي للالم كما هو الحال في البنتازوسين • يعطى في مواضع استعمال المورفين بمقدار (١ - ٢) ملغ عن طريق الفم أو حقنا في العضل قبل العمليات الجراحية •

ان الاستعمال الطويل لهذا المركب يسبب الادمان من نموذج ادمان المورفين •